



BIODIVERSITÄTS-MONITORING SCHWEIZ BDM
MONITORING DE LA BIODIVERSITÉ EN SUISSE MBD



15 JAHRE

Tagfaltermonitoring im BDM Schweiz

15 ANS

de recensement des papillons diurnes
dans le cadre du MBD Suisse

Impressum

Herausgeber / Éditeur:

Biodiversitätsmonitoring Schweiz / Monitoring de la biodiversité en Suisse

c/o Hintermann & Weber AG

Austrasse 2a

CH-4153 Reinach

Autoren / Auteurs:

Stefan Birrer, Markus Fluri, Nico Heer, Pascale Hutter, Matthias Plattner, Tobias Roth, Thomas Stalling

Gestaltung und Satz / Composition et graphismes:

Thomas Kissling

Titelfoto / Photo de couverture:

Thomas Marent

Feldmitarbeiterinnen und Feldmitarbeiter Tagfaltermonitoring / Collaborateurs de terrain du monitoring des papillons diurnes:

Michele Abderhalden, Angelika Abderhalden-Raba, Martin Albrecht, Florian Altermatt, Georg Artmann, Christian Bachmann, Oliver Balmer, Vincent Baudraz, Barbara Bertolini, Hermann Blöchliger, Daniel Bolt, Thomas Bühler-Cortesi, Markus Bur, Flurin Camenisch, Karel Cerny, Yannick Chittaro, Philippe Dubey, Goran Dusej, Sonja Engler, Karen Falsone, Laura Farina, Markus Fluri, Isabella Forini, Jérôme Fournier, Adrienne Frei, Manuel Freiburghaus, Jean-Claude Gerber, Sébastien Gerber, Sonja Gerber, Anne-Catherine Grandchamp, Stefan Grichting, Frédéric Grimaître, Stefan Hafner, Kathrin Hartmann-Walter, Mike Herrmann, Agneta Heuman, Ulrich Hiermann, Axel Hofmann, Barbara Huber, Peter Huemer, Ralph Imstepf, Andreas Jaun, Regina Joehl, Laurent Juillerat, Angela Keiser, Marie-Louise Kieffer Merki, Thomas Kissling, Seraina Klopstein, Bärbel Koch, Quentin Kohler, Andreas Lang, Paul Marchesi, Thomas Marent, Henry Martinez, Anton Mayr, Matthias Merki, Annick Morgenthaler, Rebekka Moser, Jens Nagel, Marco Nembrini, Paolo Palmi, Aline Pasche, Jérôme Pellet, Riccardo Pierallini, Mireille Pittet, Christophe Praz, Anita Python, André Rey, Thomas Röösl, Andreas Rotach, Christian Rust, Charlotte Salamin, Sabina Salvioni, Andreas Sanchez, Arno Schanowski, Stefan Schilli, Sarah Schmid, Bea Schwarzwälder, Oliver Seitz, Antoine Sierro, Thomas Stalling, Anna Stäubli, Manfred Steffen, Silvan Stöckli, Marc Tourrette, Olivier Turin, Peter Weidmann, Andreas Weidner, Remo Wenger, Barbara Wicht, Luzia Widmer, Nicola Zambelli, Mirko Zanini, Andreas Zurwerra

© Biodiversitätsmonitoring Schweiz.

15 Jahre Tagfaltermonitoring im BDM Schweiz

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des BDM-Tagfalterteams

Seit der letzten Ausgabe dieser Publikation sind weitere 5 Jahre vergangen. Nun liegen die Daten von bereits drei vollständigen Erhebungsperioden auf 450 Aufnahmeflächen vor. Dies ist Anlass genug, euch den aktuellen Stand der Ergebnisse zu präsentieren.

In den insgesamt 15 Jahren habt ihr Tausende anstrengender Kilometer auf Transekten abgesprochen und über eine Million Falter gezählt. Es ist ein einzigartiger Datensatz entstanden der seinesgleichen sucht und zu dem ich euch herzlich gratuliere. Solche Daten sind die wesentliche Grundlage für Massnahmen zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt. Ohne Informationen über die Verbreitung und Entwicklung der Arten ist es nicht möglich, schnell angemessene Massnahmen zu ergreifen. Die Indikatoren, die auf der Basis eurer Arbeit berechnet werden, sind eine Grundlage für politische Entscheide und werden oft in den Medien zitiert. Zudem konnten die BDM-Daten schon in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen wertvolle Dienste leisten.

Ich möchte euch im Namen des BAFU ganz herzlich für eure treue Mitarbeit und die aussergewöhnliche Qualität der Daten danken. So ist die aktualisierte und frisch aufgemachte Publikation der Daten auch als kleine Anerkennung eures unermüdlichen Einsatzes zu verstehen. Es würde mich sehr freuen, wenn euch das Durchstreifen der Artdossiers inspiriert und zu weiteren Jahren der Mitarbeit im Team motiviert.

Mein spezieller Dank geht auch an drei Mitarbeiter des Teams. Thomas Kissling hat in gewohnt meisterhafter Weise für die attraktive Aufmachung gesorgt. Und Thomas Marent und Martin Albrecht haben viele neue hochwertige Bilder beigezeichnet. Die vorliegende Publikation ist also durch und durch ein Gemeinschaftswerk des ganzen Teams.



Glenn Litsios, Verantwortlicher für das BDM beim BAFU

15 ans de recensement des papillons diurnes dans le cadre du MBD Suisse

Chères collaboratrices et chers collaborateurs
de l'équipe MBD papillons diurnes

La dernière version de cette publication date d'il y a cinq ans. Désormais, les données de trois cycles de relevés complets sont disponibles pour 450 sites. Ceci est clairement une raison suffisante pour vous présenter l'état actuel des résultats.

Durant les 15 dernières années, vous avez parcouru des milliers de kilomètres de transects et compté plus d'un million de papillons. Ainsi, nous avons obtenu un jeu de données unique et sans précédent, pour lequel je vous félicite sincèrement. De telles données constituent la base essentielle pour la protection et la promotion de la biodiversité. Sans information sur la répartition et l'évolution des espèces, il n'est pas possible de prendre rapidement des mesures appropriées. Les indicateurs qui sont calculés sur la base de votre travail, servent à informer les décisions politiques et sont souvent cités dans les médias. En outre, les données MBD sont d'un grand intérêt pour la recherche et apparaissent régulièrement dans des publications scientifiques.

Au nom de l'OFEV, je vous remercie chaleureusement pour votre coopération sans faille et la qualité exceptionnelle des données que vous avez récolté. Ainsi, j'aimerais au travers de ce petit cahier, exprimer toute ma reconnaissance à l'égard de votre travail. Je serais très heureux, si ces pages présentant chaque espèce pouvaient vous inspirer à poursuivre votre coopération dans l'équipe ces prochaines années.

Finalement, trois membres de l'équipe méritent des remerciements particuliers. Thomas Kissling pour mise en page qu'il a fourni, et Thomas Marent et Martin Albrecht pour les magnifiques nouvelles images qu'ils ont apporté. La présente publication est donc le fruit d'une collaboration de l'ensemble de l'équipe.



Glenn Litsios, responsable du MBD à l'OFEV

Im Rahmen des Biodiversitätsmonitorings Schweiz (BDM) wird seit 2003 die Artenvielfalt der Tagfalter erfasst. Es liegen nun drei vollständige Erhebungsperioden von jeweils 5 Jahren vor.

Der Indikator «Artenvielfalt in Landschaften (Z7)» ist eine der wichtigsten Datengrundlagen des BDM. Er zeigt auf, wie viele Gefässpflanzen-, Brutvogel- und Tagfalter-Arten in den Landschaften der Schweiz vorkommen. Nähere Angaben zu diesem Indikator finden sich auf der BDM-Homepage: www.biodiversitymonitoring.ch/de/programm.html



Schweizweit werden 450 Kilometerquadrate bearbeitet (s. Abb.), pro Jahr je ein Fünftel der Stichprobe. Im Jura und in den Südalpen ist die Stichprobe verdichtet. Innerhalb des Kilometerquadrats werden die Tagfalter entlang einer 2.5 Kilometer langen Zählstrecke (Transekt, s. Abb.) erfasst, bis zu einer Distanz von 5 m zu beiden Seiten. Es werden sieben (in den höchsten Lagen nur vier) Begehungen durchgeführt. Hiermit werden durchschnittlich 73% der im Kilometerquadrat vorhandenen Tagfalterarten erfasst. Weitere Angaben zum Stichprobendesign und zur Erfassungsmethode (Feldanleitung) finden sich auf der BDM-Homepage: www.biodiversitymonitoring.ch/de/methodik/methodenbeschriebe.html

Für die insgesamt 187 im BDM festgestellten Tagfalterarten werden in dieser Publikation diverse Angaben zum Vorkommen und zur Entwicklung präsentiert. Es sind dies:


Allgemeine Angaben zur Art

Im Kopfteil der Datenblätter werden Angaben zum Status jeder Art gemacht:

- RL CH: Gefährdungsstatus (IUCN Kategorien) gemäss der Roten Liste der Tagfalter und Widderchen der Schweiz (Wermeille et al. 2014)

- RL EU: Gefährdungsstatus (IUCN Kategorien) gemäss der Roten Liste der Tagfalter Europas (Van Swaay et al. 2010)
- Prio: Prioritätsstatus gemäss der Liste der national prioritären Arten (BAFU 2011): 1 = sehr hoch, 2 = hoch, 3 = mittel, 4 = mässig.
- UZL: Einteilung in Zielarten (Z) und Leitarten (L) gemäss den Umweltzielen Landwirtschaft (BAFU/BLW 2008).

Vorkommen




Eine Karte pro Art präsentiert das Vorkommen im BDM, differenziert nach Erst- (2003–2007), Zweit- (2008–2012) und Dritterhebung (2013–2017). Zwecks Übersichtlichkeit wurde eine etwas vereinfachte Darstellungsform gewählt, welche vom historischen Schweizer Brutvogelatlas übernommen wurde (Knaus et al. 2011):

- **konstant:** Transekte mit konstantem Vorkommen (Art in allen drei- oder der ersten und dritten Erhebungsperiode erfasst)
- **fehlend seit 2007:** Transekte mit fehlenden Nachweisen seit 2007 (Art nur in der ersten Erhebungsperiode erfasst)
- **fehlend seit 2012:** Transekte mit fehlenden Nachweisen seit 2012 (nur in der zweiten oder nur in der ersten und zweiten Erhebungsperiode erfasst)
- **neu:** Transekte mit neuen Vorkommen (Art in zweiter und dritter oder nur in dritter Erhebungsperiode erfasst)


Die Daten des BDM fließen in die Datenbank des Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) ein. Da seltene Arten im BDM eher unterrepräsentiert sind, finden sich für diese beim CSCF vollständigere Verbreitungskarten (<http://lepus.unine.ch/cartof/>).

Höhenverbreitung



Die Grafik zeigt die Höhenverbreitung jeder Art. Dargestellt ist für jedes Höhensegment die durchschnittliche Anzahl Individuen pro Transekt (Summe aller Begehungen), bezogen auf alle Erhebungen zwischen 2003 und 2017, auf denen die entsprechende Art festgestellt wurde.


Entwicklung



Darstellung des jährlichen Auftretens anhand der durchschnittlichen Individuenzahl aller Transekte, auf denen die Art zwischen 2003 und 2017 festgestellt wurde. Bei Arten, die nicht in jedem Jahr nachgewiesen wurden, sind die Jahreswerte mit Punkten dargestellt. Bei Arten, die in jedem Jahr festgestellt wurden, ist außerdem eine Linie mit dem mittleren Trend dargestellt.

Signifikante Veränderungen zwischen 2003 und 2017 sind durch einen grünen Pfeil (Zunahme) bzw. roten Pfeil (Abnahme) neben dem Abbildungstitel gekennzeichnet. Für die Analyse verwendet das BDM generalisierte und gemischte lineare Modelle (GLMM).

Phänologie



Die Grafik zeigt die Phänologie basierend auf der durchschnittlichen Individuenzahl der jeweiligen Begehung (Zeitraum) für alle Transekte zwischen 2003 und 2017, auf denen die entsprechende Art festgestellt wurde. Auf der x-Achse sind die Erhebungs-Zeiträume aufgetragen, die je nach Region geringfügig variieren (Details s. Feldanleitung).

Literatur

BAFU & BLW, 2008: Umweltziele Landwirtschaft. Hergestellt aus bestehenden rechtlichen Grundlagen. Umwelt-Wissen Nr. 0820. Bundesamt für Umwelt, Bern. 221 S.

BAFU, 2011: Liste der National Prioritären Arten. Arten mit nationaler Priorität für die Erhaltung und Förderung, Stand 2010. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1103: 132 S.

Knaus P., Graf R., Guélat J., Keller V., Schmid H. und Zbinden N., 2011: Historischer Brutvogelatlas. Die Verbreitung der Schweizer Brutvögel seit 1950. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 336 S.

Van Swaay C., Cuttelod A., Collins S., Maes D., L. pez Munguira M., Šašić M., Settele J., Verovnik R., Verstrael T., Warren M., Wiemers M. and Wynhof I., 2010. European Red List of Butterflies. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Wermeille E., Chittaro Y., Gonseth Y., 2014: Rote Liste Tagfalter und Widderchen. Gefährdete Arten der Schweiz, Stand 2012. Bundesamt für Umwelt, Bern, und Schweizer Zentrum für die Kartografie der Fauna, Neuenburg. Umwelt-Vollzug Nr. 1403: 97 S.

La diversité des espèces de papillons diurnes est recensée depuis 2003 dans le cadre du Monitoring de la biodiversité en Suisse (MBD). Nous disposons désormais de trois périodes complètes de recensement de 5 ans.

L'indicateur «Diversité des espèces dans les paysages (Z7)» correspond à une des bases de données les plus importantes au sein du MBD. Il comptabilise les espèces de plantes vasculaires, d'oiseaux nicheurs et de papillons diurnes présentes dans les paysages suisses. Le site du MBD donne plus d'informations sur cet indicateur : www.biodiversitymonitoring.ch/fr/toile-de-fond.html



Chaque année, un cinquième des quelques 450 carrés kilométriques est parcouru. L'échantillonnage a été densifié dans le Jura et dans les Alpes du Sud. Dans chaque carré kilométrique, les papillons diurnes sont recensés le long d'un itinéraire de recensement de 2,5 kilomètres de long (transect, voir ill.), jusqu'à une distance de 5 m de part et d'autre du chemin. Sept passages sont effectués (seulement quatre dans les zones les plus élevées), ce qui permet de recenser en moyenne 73% des papillons diurnes présents dans ce kilomètre carré. Vous trouverez plus d'informations sur les méthodes d'échantillonnage et de collecte de données sur le site internet du MBD :

www.biodiversitymonitoring.ch/fr/downloads/methodes.html

Vous trouverez ci-dessous différentes informations concernant la présence et l'évolution des populations des 187 espèces de papillons diurnes recensées par le MBD, à savoir :


Informations sur le statut

Au début des dossiers traitant des espèces, vous trouverez les informations sur le statut:

- LR CH : Statut de menace (catégories IUCN) selon la liste rouge Papillons et Zygènes (Wermeille et al. 2014)

- LR EU : Statut de menace (catégories IUCN) selon la liste rouge européenne pour les papillons (Van Swaay et al. 2010)
- Prio : Priorité selon la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2011): 1 = très élevée, 2 = élevée, 3 = moyenne, 4 = faible.
- UZL : Espèces cibles (Z) et caractéristiques (L) selon les objectifs environnementaux pour l'agriculture (OFEV et OFAG 2008).

Présence




Une carte par espèce présente la distribution basée sur les données du MBD en différenciant le premier (2003–2007), le deuxième (2008–2012) et le troisième relevé (2013–2017). Une forme de présentation quelque peu simplifiée a été adoptée pour des raisons de lisibilité, tirée de l'Atlas historique des oiseaux nicheurs (Knaus et al., 2011) :

- **constant** : transects avec une présence constante (espèce présente lors de tous les relevés ou lors du premier et du dernier relevé)
- **manquant depuis 2007** : transects sans observations après 2007 (espèce présente uniquement lors du premier relevé)
- **manquant depuis 2012** : transects sans observations après 2012 (espèce présente lors du premier et du deuxième relevé ou seulement lors du deuxième relevé)
- **nouveau** : transects avec une nouvelle présence (espèce présente lors du deuxième et du troisième ou seulement lors du troisième relevé).


Les données du MBD sont intégrées dans la base de données du Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF). Étant donné que les espèces rares sont plutôt sous-représentées dans le MBD, des cartes plus complètes de leur répartition sont disponibles sur le site du CSCF (<https://lepus.unine.ch/carto/>).

Distribution altitudinale



Le graphique représente la distribution altitudinale d'une espèce. Le nombre moyen d'individus par transect (somme de tous les passages) rapporté à l'ensemble des relevés des années 2003–2017 au cours desquels l'espèce correspondante a été recensée est représenté pour chaque segment altitudinal.


Évolution



Représentation de la présence annuelle à l'aide du nombre moyen d'individus sur tous les transects sur lesquels l'espèce a été recensée. Les valeurs annuelles sont représentées par des points pour les espèces qui n'ont pas été recensées chaque année. Pour les espèces qui ont pu être recensées chaque année, une ligne représente la tendance moyenne.

Les changements importants entre 2003 et 2017 sont symbolisés par une flèche verte (augmentation) ou une flèche rouge (diminution) placée à côté du titre de l'illustration. Le MBD utilise des modèles linéaires généralisés et mixtes (MLGM).

Phénologie



Le graphique représente la phénologie des espèces en se basant sur le nombre moyen d'individus sur tous les transects sur lesquels l'espèce a été recensée entre 2003 et 2017. L'axe des abscisses représente la période de relevé, qui peut varier légèrement d'une région à l'autre (pour plus de détails, voir l'introduction aux travaux sur le terrain).

Bibliographie

OFEV et OFAG, 2008: Objectifs environnementaux pour l'agriculture. A partir de bases légales existantes. Connaissance de l'environnement n° 0820. Office fédéral de l'environnement, Berne: 221 p.

OFEV, 2011: Espèces prioritaires au niveau national. Liste des espèces prioritaires pour la conservation au niveau national, état 2010. Office fédéral de l'environnement, Berne. L'environnement pratique n° 1103: 132 p.

Knaus P., Graf R., Guélat J., Keller V., Schmid H. und Zbinden N., 2011: Atlas historique des oiseaux nicheurs. La répartition des oiseaux nicheurs de Suisse depuis 1950. Station ornithologique suisse, Sempach. 336 p.

Van Swaay C., Cuttelod A., Collins S., Maes D., L. pez Munguira M., Šašić M., Settele J., Verovnik R., Verstrael T., Warren M., Wiemers M. and Wynhof I., 2010. European Red List of Butterflies. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Wermeille E., Chittaro Y., Gonseth Y. 2014: Liste rouge Papillons diurnes et Zygènes. Espèces menacées en Suisse, état 2012. Office fédéral de l'environnement, Berne, et Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel. L'environnement pratique n° 1403: 97 p.

Adscita statices-Komplex

A. alpina, *A. dujardini*, *A. geryon*, *A. mannii*, *A. statices*

Komplex des Ampfer-Grünwiderchens

Complexe de la Turquoise

Status (RL CH / Prio):

NT / –

Status (RL EU):

–

UZL (Z / L):

–




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 79 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=16)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=24)
- konstant / constant (N=38)
- neu / nouveau (N=41)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Zygaena minos

Bibernell-Widderchen
Zygène diaphane

Status (RL CH / Prio):

VU / 4

Status (RL EU):

–

UZL (Z / L):

–




THOMAS STALLING

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 0 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Zygaena purpuralis

Thymian-Widderchen
Zygène pourpre

Status (RL CH / Prio):

NT / –

Status (RL EU):

–

UZL (Z / L):

–




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 60 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=15)
- konstant / constant (N=40)
- neu / nouveau (N=20)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Zygaena fausta

Bergkronwicken-Widderchen
Zygène de la Bruyère

Status (RL CH / Prio): VU / 4

Status (RL EU): –

UZL (Z / L): Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 8 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=4)
- neu / nouveau (N=4)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Zygaena carniolica

Krainisches Widderchen

Zygène de la Carniole

Status (RL CH / Prio):

VU / 4

Status (RL EU):

–

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 12 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=6)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Zygaena loti

Beilfleck-Widderchen
Zygène de la Millefeuille

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	-
UZL (Z / L):	L



THOMAS MARENT



Zygaena exulans

Alpen-Widderchen

Zygène exilée, Zygène du Lotier

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

-

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 53 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=20)
- konstant / constant (N=38)
- neu / nouveau (N=15)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 41 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale







Phänologie / Phénologie



Zygaena romeo

Südliches Platterbsen-Widderchen
Zygène de la Gesse

Status (RL CH / Prio):	VU / -
Status (RL EU):	-
UZL (Z / L):	Z



Zygaena osterodensis

Nördliches Platterbsen-Widderchen, Platterbsen-Widderchen
Zygène d'Ostérode

Status (RL CH / Prio):

VU / 2

Status (RL EU):

–

UZL (Z / L):

–




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 6 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 18 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Zygaena viciae

Kleines Fünffleck-Widderchen
Zygène du Mélilot

Status (RL CH / Prio):	NT / 4
Status (RL EU):	-
UZL (Z / L):	L



THOMAS MARENT



Zygaena ephialtes

Veränderliches Widderchen
Zygène de la Coronille

Status (RL CH / Prio):

VU / –

Status (RL EU):

–

UZL (Z / L):

Z




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 7 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Zygaena transalpina

Hufeisenklee-Widderchen
Zygène transalpine

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	-
UZL (Z / L):	-



THOMAS MARENT



Zygaena filipendulae

Gewöhnliches Widderchen, Sechsfleck-Widderchen
Zygène de la Filipendule

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

-

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 180 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=20)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=41)
- konstant / constant (N=108)
- neu / nouveau (N=72)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 12 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Zygaena Ionicerae

Grosses Fünffleck-Widderchen, Klee-Widderchen
Zygène du Chèvrefeuille

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	-
UZL (Z / L):	-



THOMAS MARENT



Zygaena trifolii

Sumpfhornklee-Widderchen
Zygène du Trèfle

Status (RL CH / Prio):

CR / 2

Status (RL EU):

–

UZL (Z / L):

Z




THOMAS KISSLING

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erynnis tages

Dunkler Dickkopffalter, Kronwicken-Dickkopffalter
Point-de-Hongrie

Hesperiidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




MARKUS FLURI

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 189 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=18)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=43)
- konstant / constant (N=123)
- neu / nouveau (N=66)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Carcharodus alceae

Malven-Dickkopffalter

Grisette, Hespérie de l'Alcée

Status (RL CH / Prio):

NT / 2

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 56 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=16)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=19)
- konstant / constant (N=13)
- neu / nouveau (N=43)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Carcharodus lavatherae

Grünlicher Dickkopffalter
Hespérie de l'Epiaire

Hesperiidae

Status (RL CH / Prio): EN / 2

Status (RL EU): NT

UZL (Z / L): Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 2 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Carcharodus floccifera

Betonien-Dickkopffalter, Heilziest-Dickkopffalter
Hespérie du Marrube

Status (RL CH / Prio):

EN / 2

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 8 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=8)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Spialia sertorius

Roter Würfelfalter, Roter Würfel-Dickkopffalter
Hespérie des Sanguisorbes

Status (RL CH / Prio): NT / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 67 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=15)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=29)
- konstant / constant (N=36)
- neu / nouveau (N=31)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pyrgus malvae-Komplex

P. malvae, *P. malvoides*

Komplex des Kleinen Würfelfalters
Complexe de l'Hespérie de la Mauve

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 173 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=24)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=48)
- konstant / constant (N=103)
- neu / nouveau (N=70)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pyrgus alveus-Komplex

P. armoricanus, *P. alveus*, *P. accretus*, *P. warrenensis*, *P. serratulae*,
P. carlinae, *P. cirsii*, *P. onopordi*, *P. andromedae*, *P. cacaliae*

Komplex des Sonnenröschen-Würfelfalters
Complexe du Plaint-chant

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):





LC

UZL (Z / L):

-



THOMAS MARENT



Pyrgus carthami

Weissgesäumter Würfelfalter
Hespérie du Carthame

Status (RL CH / Prio):


VU / 4

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

–




MARKUS FLURI

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Heteropterus morpheus

Spiegelfleck-Dickkopffalter
Miroir

Hesperiidae

Status (RL CH / Prio): EN / 2

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 11 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=8)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Carterocephalus palaemon

Gelbwüfliger Dickkopffalter
Echiquier, Hespérie du Brome

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 110 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=24)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=41)
- konstant / constant (N=54)
- neu / nouveau (N=56)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Thymelicus lineola

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter
Hespérie du Dactyle





Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L



THOMAS MARENT



Thymelicus sylvestris

Braunkolbiger Braundickkopffalter
Hespérie de la Houque, Bande noire

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 220 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=19)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=29)
- konstant / constant (N=158)
- neu / nouveau (N=62)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 20 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Thymelicus acteon

Mattscheckiger Braundickkopffalter
Hespérie du Chiendent

Hesperiidae

Status (RL CH / Prio): EN / 3

Status (RL EU): NT

UZL (Z / L): Z




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 3 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Hesperia comma

Weissfleckiger Kommafalter, Komma-Dickkopffalter
Comma, Virgule

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 177 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=19)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=26)
- konstant / constant (N=134)
- neu / nouveau (N=43)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale




Phänologie / Phénologie







Ochlodes venata

Mattfleckiger Kommafalter, Rostfarbiger Dickkopffalter
Sylvaine

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-



MARTIN ALBRECHT



Parnassius mnemosyne

Schwarzer Apollo
Semi-Apollon

Status (RL CH / Prio):

VU / 2

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 15 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=8)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=6)
- neu / nouveau (N=9)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Parnassius phoebus

Alpenapollo
Petit Apollon

Papilionidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 28 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=16)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=10)
- konstant / constant (N=23)
- neu / nouveau (N=5)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Parnassius apollo

Apollo
Apollon

Status (RL CH / Prio):

NT / 3

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 67 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=18)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=23)
- konstant / constant (N=47)
- neu / nouveau (N=20)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Iphiclides podalirius

Segelfalter
Flambé

Papilionidae

Status (RL CH / Prio):

NT / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 27 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=9)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=6)
- konstant / constant (N=15)
- neu / nouveau (N=12)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Papilio machaon

Schwalbenschwanz
Machaon

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 227 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=43)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=63)
- konstant / constant (N=164)
- neu / nouveau (N=63)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Leptidea sinapis-Komplex

L. sinapis, *L. juvernica*

Komplex des Tintenfleckweisslings
Complexe de la Piéride de la Moutarde

Pieridae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 241 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=20)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=35)
- konstant / constant (N=171)
- neu / nouveau (N=70)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 9 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Anthocharis cardamines

Aurorafalter
Aurore

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 298 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=19)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=50)
- konstant / constant (N=261)
- neu / nouveau (N=37)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Euchloe simplonia

Mattfleckiger Weissling
Piéride des Biscutelles, Marbré de Freyer

Pieridae

Status (RL CH / Prio): VU / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




HEINER ZIEGLER

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 5 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=4)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Aporia crataegi

Baumweissling
Gazé

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 164 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=21)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=32)
- konstant / constant (N=112)
- neu / nouveau (N=52)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 13 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Pieris brassicae

Grosser Kohlweissling
Piéride du Chou

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-



MARTIN ALBRECHT



Pieris napi-Komplex

Pieris napi, *Pieris bryoniae*

Komplex des Grünaderweisslings

Complexe de la Piéride du Navet

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 415 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=10)
- konstant / constant (N=387)
- neu / nouveau (N=28)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 49 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pieris rapae-Komplex

Pieris rapae, *Pieris mannii*

Komplex des Kleinen Kohlweisslings
Complexe de la Piéride de la Rave

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 394 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=8)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=37)
- konstant / constant (N=351)
- neu / nouveau (N=43)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 33 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pontia callidice

Alpenweissling
Piéride du Vêlar

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




HEINER ZIEGLER

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 37 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=10)
- konstant / constant (N=22)
- neu / nouveau (N=15)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pontia edusa

Resedafalter
Marbré de Fabricius

Pieridae

Status (RL CH / Prio): NT / 3

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 7 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Colias phicomone

Alpengelbling
Candide

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 78 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=23)
- konstant / constant (N=58)
- neu / nouveau (N=20)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 15 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Colias palaeno

Hochmoorgelbling
Solitaire

Pieridae

Status (RL CH / Prio): NT / 3

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 53 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=9)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=17)
- konstant / constant (N=40)
- neu / nouveau (N=13)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 11 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Colias croceus

Wandergelbling, Postillon, Achter Souci

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 228 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=31)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=96)
- konstant / constant (N=119)
- neu / nouveau (N=109)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Colias hyale-Komplex

C. alfacariensis, *C. hyale*

Komplex des Gemeinen Heufalters
Complexe du Soufré

Pieridae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 230 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=24)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=65)
- konstant / constant (N=159)
- neu / nouveau (N=71)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Gonepteryx rhamni

Zitronenfalter
Citron

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 271 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=32)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=18)
- konstant / constant (N=136)
- neu / nouveau (N=135)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Hamearis lucina

Frühlingsscheckenfalter, Brauner Würfelfalter
Lucine

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 51 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=11)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=32)
- neu / nouveau (N=19)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lycaena phlaeas

Kleiner Feuerfalter
Cuivré commun

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 113 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=37)
- konstant / constant (N=40)
- neu / nouveau (N=73)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lycaena helle

Blauschillernder Feuerfalter
Cuivré de la Bistorte

Status (RL CH / Prio):


VU / 2

Status (RL EU):

EN

UZL (Z / L):

Z




MARKUS FLURI

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 7 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=4)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lycaena virgaureae

Dukatenfalter
Cuivré de la Verge d'Or

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 83 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=11)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=15)
- konstant / constant (N=72)
- neu / nouveau (N=11)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 21 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lycaena tityrus

Brauner Feuerfalter
Cuivré fuligineux

Lycaenidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 178 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=17)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=57)
- konstant / constant (N=108)
- neu / nouveau (N=70)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lycaena alciphron

Violetter Feuerfalter

Cuivré flamboyant, Cuivré mauvin

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 12 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=6)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lycaena hippothoe

Kleiner Ampferfeuerfalter
Cuivré écarlate

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 98 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=12)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=36)
- konstant / constant (N=69)
- neu / nouveau (N=29)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Thecla betulae

Nierenfleck, Birkenzipfelfalter, Nierenfleck-Zipfelfalter
Thécla du Bouleau

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 20 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=20)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Neozephyrus quercus

Blauer Eichenzipfelfalter
Thécla du Chêne

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-



MARTIN ALBRECHT



Callophrys rubi

Brombeerzipfelfalter, Grüner Zipfelfalter
Thécla de la Ronce, Argus vert

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




NICO HEER

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 151 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=18)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=19)
- konstant / constant (N=120)
- neu / nouveau (N=31)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 9 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Satyrium w-album

Ulmen-Zipfelfalter
Thécla de l'Orme

Lycaenidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 40 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=16)
- konstant / constant (N=12)
- neu / nouveau (N=28)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Satyrium pruni

Pflaumen-Zipfelfalter
Thécla du Prunellier

Status (RL CH / Prio):

VU / 2

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=3)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Satyrium spini

Kreuzdorn-Zipfelfalter, Schlehenzipfelfalter
Thécla des Nerpruns

Status (RL CH / Prio): NT / 3

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




MARKUS FLURI

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 4 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Satyrium ilicis

Brauner Eichen-Zipfelfalter, Eichenzipfelfalter
Thécla de l'Yeuse

Status (RL CH / Prio):

EN / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 2 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Satyrium acaciae

Kleiner Schlehen-Zipfelfalter, Akazienzipfelfalter
Thécla de l'Amarel, Thécla de l'Acacia

Status (RL CH / Prio):

EN / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 0 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lampides boeticus

Geschwänzter Blasenstrauchbläuling, Grosser Wanderbläuling
Azuré porte-queue

Status (RL CH / Prio):

NE / –

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

–




THOMAS KISSLING

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 2 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Cacyreus marshalli

Pelargonienbläuling
Brun des Pélargoniums

Status (RL CH / Prio):	NE / –
Status (RL EU):	–
UZL (Z / L):	–



THOMAS STALLING



Cupido minimus

Zwergbläuling
Argus frêle

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 181 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=17)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=29)
- konstant / constant (N=145)
- neu / nouveau (N=36)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 24 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Cupido osiris

Kleiner Alpenbläuling
Azuré de la Chevrette, Azuré Osiris

Lycaenidae

Status (RL CH / Prio): EN / 2

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): Z




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 4 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=2)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Cupido argiades

Kurzschwänziger Bläuling
Azuré du Trèfle

Status (RL CH / Prio):

NT / 2

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

–




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 101 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=24)
- konstant / constant (N=10)
- neu / nouveau (N=91)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Cupido alcetas

Südlicher Kurzschwänziger Bläuling
Azuré de la Faucille

Status (RL CH / Prio):

NT / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




MARKUS FLURI

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 48 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=12)
- neu / nouveau (N=36)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Celastrina argiolus

Faulbaumbläuling
Azuré des Nerpruns

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 136 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=25)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=56)
- konstant / constant (N=62)
- neu / nouveau (N=74)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pseudophilotes baton





Graublauer Bläuling
Azuré de la Sarriette, Azuré du Thym

Lycaenidae

Status (RL CH / Prio):	VU / 3
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	Z



MARTIN ALBRECHT



Scolitantides orion

Fetthennebläuling
Azuré des Orpins

Status (RL CH / Prio):


VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 9 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Glaucopsyche alexis

Himmelblauer Steinkleebläuling, Alexis-Bläuling
Azuré des Cytises

Status (RL CH / Prio): VU / 3

Status (RL EU): LC


UZL (Z / L): Z



Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 15 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=5)
- neu / nouveau (N=10)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Iolana iolas

Blasenstrauchbläuling
Azuré du Baguenaudier

Status (RL CH / Prio):

EN / 1

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z



THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 2 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=0)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Maculinea arion

Schwarzfleckiger Ameisenbläuling, Schwarzgefleckter Bläuling
Azuré du Serpolet





Status (RL CH / Prio): NT / 3

Status (RL EU): EN

UZL (Z / L): L



THOMAS MARENT



Maculineaalcon-Komplex

M. alcon, *M. rebeli*

Komplex des Enzian-Ameisenbläulings
Complexe de l'Azuré des mouillères

Status (RL CH / Prio):

VU / –

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 8 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=6)
- konstant / constant (N=4)
- neu / nouveau (N=4)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Maculinea teleius

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Grosser Moorbläuling
Azuré de la Sanguisorbe

Status (RL CH / Prio): EN / 2

Status (RL EU): VU

UZL (Z / L): Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 4 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 12 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Maculinea nausithous

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Dunkler Moorbläuling
Azuré des paluds

Status (RL CH / Prio):

EN / 2

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 6 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=5)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 14 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Plebeius argus

Argus-Bläuling, Geisskleebläuling
Azuré de l'Ajonc

Status (RL CH / Prio):

NT / –

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 27 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=8)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=16)
- neu / nouveau (N=11)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Plebeius idas

Idas-Bläuling, Ginster-Bläuling
Azuré du Genêt

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 40 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=27)
- neu / nouveau (N=13)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 27 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Plebeius optilete

Violetter Silberfleckbläuling, Hochmoor-Bläuling
Azuré de la Canneberge

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 36 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=26)
- neu / nouveau (N=10)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Plebeius glandon

Dunkler Alpenbläuling
Azuré des Soldanelles

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 32 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=10)
- konstant / constant (N=21)
- neu / nouveau (N=11)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 23 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Plebeius orbitulus

Heller Alpenbläuling
Azuré de la Phaqué, Azuré alpin

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	L



THOMAS MARENT



Aricia agestis-Komplex

A. agestis, *A. artaxerxes*

Komplex des Sonnenröschen-Bläulings

Complexe du Collier de corail

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 176 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=18)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=43)
- konstant / constant (N=97)
- neu / nouveau (N=79)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Aricia eumedon

Storchschnabel-Bläuling, Schwarzbrauner Bläuling
Argus de la Sanguinaire

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 84 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=24)
- konstant / constant (N=53)
- neu / nouveau (N=31)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Aricia nicias

Nicias-Bläuling
Azuré des Géraniums

Status (RL CH / Prio):

LC / 4

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 2 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=2)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus semiargus

Violetter Waldbläuling, Rotklee-Bläuling
Azuré des Anthyllides, Demi-Argus

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 329 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=17)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=25)
- konstant / constant (N=248)
- neu / nouveau (N=81)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 15 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus escheri

Escher-Bläuling
Azuré du Plantain

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 5 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=0)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus dorylas

Wundkleebläuling, Steinkleebläuling
Azuré du Mélilot

Status (RL CH / Prio): NT / -

Status (RL EU): NT

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 36 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=18)
- neu / nouveau (N=18)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus amandus

Prächtiger Bläuling, Vogelwicken-Bläuling
Azuré de la Jarosse

Status (RL CH / Prio):

VU / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 5 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=3)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=0)
- konstant / constant (N=4)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus thersites

Esparssettenbläuling
Azuré de l'Esparcette

Status (RL CH / Prio):

VU / 4

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 12 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=15)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=14)
- konstant / constant (N=5)
- neu / nouveau (N=7)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus icarus

Hauhechelbläuling
Azuré de la Bugrane

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 349 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=12)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=23)
- konstant / constant (N=297)
- neu / nouveau (N=52)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 36 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus eros

Eros-Bläuling
Azuré de l'Oxytropide

Lycaenidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): NT

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 35 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=13)
- konstant / constant (N=22)
- neu / nouveau (N=13)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus daphnis

Zahnflügelbläuling
Azuré de l'Orobe

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus bellargus

Himmelblauer Bläuling
Azuré bleu céleste

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 118 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=20)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=29)
- konstant / constant (N=70)
- neu / nouveau (N=48)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus coridon

Silbergrüner Bläuling
Argus bleu-nacré

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 133 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=11)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=21)
- konstant / constant (N=109)
- neu / nouveau (N=24)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 42 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Polyommatus damon

Grünblauer Bläuling
Azuré du Sainfoin

Lycaenidae

Status (RL CH / Prio):

VU / 4

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 29 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=3)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=9)
- konstant / constant (N=20)
- neu / nouveau (N=9)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 13 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Libythea celtis

Zürgelbaumschnauzenfalter
Echancré

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=1)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Argynnis paphia

Kaisermantel
Tabac d'Espagne

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 283 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=37)
- konstant / constant (N=211)
- neu / nouveau (N=72)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 18 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Argynnis aglaja

Grosser Perlmutterfalter
Grand Nacré

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 187 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=22)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=30)
- konstant / constant (N=145)
- neu / nouveau (N=42)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 16 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Argynnis adippe

Märzveilchenfalter, Hundsveilchenperlmutterfalter
Moyen Nacré

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 119 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=23)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=53)
- konstant / constant (N=68)
- neu / nouveau (N=51)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 5 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Argynnis niobe

Stiefmütterchenperlmutterfalter, Mittlerer Perlmutterfalter
Chiffre

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 103 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=39)
- konstant / constant (N=77)
- neu / nouveau (N=26)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Issoria lathonia

Kleiner Perlmutterfalter
Petit Nacré

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 141 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=30)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=58)
- konstant / constant (N=63)
- neu / nouveau (N=78)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Brenthis ino

Violetter Silberfalter, Randpunktierter Violettsilberfalter
Nacré de la Sanguisorbe

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 70 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=12)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=19)
- konstant / constant (N=46)
- neu / nouveau (N=24)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 11 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Brenthis daphne

Brombeerperlmutterfalter
Nacré de la Ronce

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-



THOMAS MARENT



Boloria euphrosyne

Veilchenperlmutterfalter, Silberfleck-Perlmutterfalter
Grand Collier argenté

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 183 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=24)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=41)
- konstant / constant (N=152)
- neu / nouveau (N=31)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 15 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Boloria selene

Braunfleckiger Perlmutterfalter
Petit Collier argenté

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 78 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=15)
- konstant / constant (N=49)
- neu / nouveau (N=29)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 10 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Boloria titania

Natterwurzperlmutterfalter
Nacré porphyrin

Status (RL CH / Prio):


LC / -

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 119 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=23)
- konstant / constant (N=106)
- neu / nouveau (N=13)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Boloria dia

Hainveilchenperlmutterfalter, Magerrasen-Perlmutterfalter
Petite Violette

Status (RL CH / Prio): NT / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 29 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=22)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=20)
- konstant / constant (N=15)
- neu / nouveau (N=14)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Boloria thore

Alpenperlmutterfalter
Nacré noirâtre

Status (RL CH / Prio):


LC / 2

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 37 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=9)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=9)
- konstant / constant (N=21)
- neu / nouveau (N=16)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Boloria napaea-Komplex

B. napaea, *B. pales*

Komplex des Hochalpenperlmutterfalters
Complexe du Nacré des Renouées

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 105 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=5)
- konstant / constant (N=94)
- neu / nouveau (N=11)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 50 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Boloria aquilonaris

Hochmoorperlmutterfalter
Nacré de la Canneberge

Status (RL CH / Prio):

EN / 2

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Vanessa atalanta

Admiral
Vulcain

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 409 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=8)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=22)
- konstant / constant (N=339)
- neu / nouveau (N=70)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Vanessa cardui

Distelfalter

Vanesse des Chardons, Belle Dame

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 334 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=36)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=62)
- konstant / constant (N=239)
- neu / nouveau (N=95)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Inachis io

Tagpfauenauge
Paon-du-jour

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 205 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=45)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=85)
- konstant / constant (N=101)
- neu / nouveau (N=104)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Aglais urticae

Kleiner Fuchs
Petite Tortue

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 420 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=11)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=15)
- konstant / constant (N=389)
- neu / nouveau (N=31)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 26 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Polygonia c-album

C-Falter
C-blanc, Robert-le-diable, Gamma

Status (RL CH / Prio):	LC / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-



THOMAS MARENT



Araschnia levana

Landkärtchen
Carte géographique

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 134 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=34)
- konstant / constant (N=88)
- neu / nouveau (N=46)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Nymphalis antiopa





Trauermantel
Morio

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):	VU / 4
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-



THOMAS MARENT



Nymphalis polychloros

Grosser Fuchs
Grande Tortue

Status (RL CH / Prio):

LC / 4

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 21 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=33)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=14)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=21)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Euphydryas cynthia

Veilchenscheckenfalter
Damier de l'Alchémille

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 25 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=3)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=16)
- konstant / constant (N=13)
- neu / nouveau (N=12)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Euphydryas aurinia

Skabiosenscheckenfalter
Damier de la Sucisse

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 56 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=20)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=26)
- konstant / constant (N=43)
- neu / nouveau (N=13)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Euphydryas intermedia

Alpen-Maivogel, Geissblatt-Scheckenfalter
Damier rouge, Damier du Chèvrefeuille

Status (RL CH / Prio): NT / 4

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 10 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=7)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 7 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea cinxia

Wegerichscheckenfalter, Gemeiner Scheckenfalter
Mélitée du Plantain

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 14 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=7)
- neu / nouveau (N=7)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea phoebe

Flockenblumenscheckenfalter
Mélitée des Centaurées

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

NT / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 27 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=14)
- konstant / constant (N=16)
- neu / nouveau (N=11)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea didyma

Roter Scheckenfalter
Mélitée orangée

Status (RL CH / Prio):

VU / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 14 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=9)
- neu / nouveau (N=5)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 11 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea diamina

Baldrianscheckenfalter, Silberscheckenfalter
Mélitée noirâtre

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 131 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=12)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=15)
- konstant / constant (N=101)
- neu / nouveau (N=30)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 14 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea deione

Leinkraut-Scheckenfalter
Mélitée des Linaires

Status (RL CH / Prio):

EN / 1

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=0)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea varia

Bündner Scheckenfalter
Mélitée de la Gentiane, Mélitée alpine

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 14 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=8)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea parthenoides

Westlicher Scheckenfalter
Mélitée des Scabieuses

Status (RL CH / Prio):


VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 9 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 4 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea aurelia

Ehrenpreisscheckenfalter
Mélitée des Digitales

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

EN / 2

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 4 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea asteria

Kleiner Scheckenfalter
Mélitée des Grisons

Status (RL CH / Prio):

EN / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 5 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=2)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melitaea athalia

Wachtelweizenscheckenfalter
Mélitée du Mélampyre

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):


L



Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 148 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=16)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=26)
- konstant / constant (N=121)
- neu / nouveau (N=27)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 29 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Limenitis populi

Grosser Eisvogel
Grand Sylvain

Status (RL CH / Prio):


VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

–




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 3 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Limenitis camilla

Kleiner Eisvogel
Petit Sylvain

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 126 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=11)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=26)
- konstant / constant (N=72)
- neu / nouveau (N=54)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 6 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Limenitis reducta

Blauschwarzer Eisvogel
Sylvain azuré

Status (RL CH / Prio):

EN / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 3 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=0)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Neptis rivularis

Schwarzer Trauerfalter
Sylvain des Spirées

Status (RL CH / Prio):	NT / -
Status (RL EU):	LC
UZL (Z / L):	-



THOMAS MARENT



Apatura ilia

Kleiner Schillerfalter
Petit Mars changeant

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

–




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 5 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=5)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Apatura iris

Grosser Schillerfalter
Grand Mars changeant

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): NT / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 59 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=25)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=21)
- konstant / constant (N=13)
- neu / nouveau (N=46)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pararge aegeria

Waldbrettspiel
Tircis

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 300 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=15)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=32)
- konstant / constant (N=252)
- neu / nouveau (N=48)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lasiommata megera

Mauerfuchs
Satyre, Mégère

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 227 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=15)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=34)
- konstant / constant (N=117)
- neu / nouveau (N=110)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lasiommata petropolitana

Braunscheckauge
Gorgone

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 110 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=24)
- konstant / constant (N=80)
- neu / nouveau (N=30)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 9 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lasiommata maera

Braunauge
Némusien (mâle), Ariane (femelle)

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 207 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=21)
- konstant / constant (N=171)
- neu / nouveau (N=36)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 24 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Lopinga achine

Gelbringfalter
Bacchante

Status (RL CH / Prio):

EN / 2

Status (RL EU):

VU

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 6 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=3)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=2)
- neu / nouveau (N=4)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 1 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Coenonympha tullia

Grosses Wiesenvögelchen
Fadet des tourbières

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

CR / 2

Status (RL EU):

VU

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Coenonympha arcania

Weissbindiges Wiesenvögelchen, Perlgrasfalter
Céphale

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 24 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=6)
- konstant / constant (N=15)
- neu / nouveau (N=9)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Coenonympha glycerion

Rostbraunes Wiesenvögelchen
Fadet de la Mélique

Status (RL CH / Prio):

EN / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS STALLING

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 2 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=2)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Coenonympha gardetta-Komplex

C. darwiniana, *C. gardetta*

Komplex des Alpenwiesenvögelchens

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

-

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 120 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=106)
- neu / nouveau (N=14)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 80 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Coenonympha pamphilus

Kleines Wiesenvögelchen
Fadet commun, Procris

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 301 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=246)
- neu / nouveau (N=55)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 34 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Aphantopus hyperantus

Brauner Waldvogel, Schornsteinfeger
Tristan

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 262 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=14)
- konstant / constant (N=228)
- neu / nouveau (N=34)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 61 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Pyronia tithonus

Gelbes Ochsenauge, Braungerändertes Ochsenauge
Amaryllis

Status (RL CH / Prio):

LC / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 19 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=11)
- neu / nouveau (N=8)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 35 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Maniola jurtina

Grosses Ochsenauge
Myrtil

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 318 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=279)
- neu / nouveau (N=39)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 116 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Hyponephele lycaon

Kleines Ochsenauge
Misis

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

VU / 4

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 11 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=8)
- neu / nouveau (N=3)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 31 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia ligea

Milchfleck, Waldmohrenfalter, Weissbindiger Mohrenfalter
Moiré blanc-fascié

Status (RL CH / Prio):


LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 183 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=24)
- konstant / constant (N=161)
- neu / nouveau (N=22)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 26 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia euryale

Weissbindiger Bergwald-Mohrenfalter
Moiré frange-pie

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 146 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=8)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=38)
- konstant / constant (N=117)
- neu / nouveau (N=29)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 68 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia eriphyle

Ähnlicher Mohrenfalter

Moiré bavaois, Moiré savoyard

Status (RL CH / Prio):


LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 16 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=9)
- neu / nouveau (N=7)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 17 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia manto

Gelbgefleckter Mohrenfalter
Moiré variable

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




HEINER ZIEGLER

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 57 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=8)
- konstant / constant (N=53)
- neu / nouveau (N=4)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 38 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia flavofasciata

Gelbbindenmohrenfalter
Moiré des Grisons

Status (RL CH / Prio):

NT / 3

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 4 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=2)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia epiphron

Knochs-Mohrenfalter
Moiré de la Canche

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 82 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=18)
- konstant / constant (N=63)
- neu / nouveau (N=19)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 20 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia pharte

Unpunktierter Mohrenfalter
Moiré aveuglé

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 64 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=9)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=20)
- konstant / constant (N=48)
- neu / nouveau (N=16)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 19 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia melampus

Kleiner Mohrenfalter
Moiré des Pâturins

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 123 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=16)
- konstant / constant (N=107)
- neu / nouveau (N=16)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 57 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia sudetica

Sudetenmohrenfalter
Moiré des Sudètes

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

VU

UZL (Z / L):

Z



MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 1 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=0)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=0)
- konstant / constant (N=1)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 20 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie




Erebia aethiops

Waldteufel, Graubindiger Mohrenfalter
Moiré sylvicole





Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L



THOMAS MARENT



Erebia triaria

Alpen-Mohrenfalter
Moiré printanier

Status (RL CH / Prio):

VU / 2

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 7 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=5)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 2 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia medusa

Rundaugenmohrenfalter, Blutgrasfalter
Moiré franconien

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 71 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=11)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=13)
- konstant / constant (N=51)
- neu / nouveau (N=20)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 12 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia alberganus

Mandeläugiger Mohrenfalter, Gelbäugiger Mohrenfalter
Moiré lancéolé

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 56 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=42)
- neu / nouveau (N=14)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 24 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia pluto

Eismohrenfalter
Moiré velouté

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 26 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=22)
- neu / nouveau (N=4)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 28 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia gorge

Felsenmohrenfalter
Moiré chamoisé

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 55 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=10)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=44)
- neu / nouveau (N=11)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 15 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia mnestra

Blindpunktmohrenfalter
Moiré fauve

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 35 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=11)
- konstant / constant (N=25)
- neu / nouveau (N=10)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 9 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia tyndarus

Schweizer Schillernder Mohrenfalter
Moiré cuivré

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 95 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=9)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=11)
- konstant / constant (N=87)
- neu / nouveau (N=8)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 81 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia cassioides

Schillernder Mohrenfalter
Moiré lustré

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): -




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 5 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=3)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 49 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia pronoe

Quellenmohrenfalter
Moiré fontinal

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 44 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=35)
- neu / nouveau (N=9)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 40 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia styx

Styx-Mohrenfalter
Moiré stygien

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

EN / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




NICO HEER

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 0 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=1)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=0)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia montana

Marmorierter Mohrenfalter
Moiré striolé

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 77 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=8)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=20)
- konstant / constant (N=56)
- neu / nouveau (N=21)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 15 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia oeme

Doppelaugenmohrenfalter
Moiré des Luzules

Status (RL CH / Prio): LC / -

Status (RL EU): LC

UZL (Z / L): L




MARTIN ALBRECHT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 56 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=6)
- konstant / constant (N=48)
- neu / nouveau (N=8)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 35 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia meolans

Randaugenmohrenfalter, Gelbbindiger Mohrenfalter
Moiré des Fétuques

Status (RL CH / Prio):

LC / 4

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 42 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=13)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=15)
- konstant / constant (N=28)
- neu / nouveau (N=14)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 8 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Erebia pandrose

Graubrauner Mohrenfalter
Moiré cendré

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 69 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=12)
- konstant / constant (N=60)
- neu / nouveau (N=9)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 24 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Melanargia galathea

Schachbrettfalter, Damenbrett, Schachbrett
Demi-Deuil

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 276 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=16)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=21)
- konstant / constant (N=221)
- neu / nouveau (N=55)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 44 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Satyrus ferula

Weisskernaue
Grande Coronide

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

NT / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 17 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=4)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=7)
- konstant / constant (N=8)
- neu / nouveau (N=9)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 25 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Minois dryas

Blauauge, Blaukernaue, Blauäugiger Waldportier
Grand Nègre des bois

Status (RL CH / Prio):

NT / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 32 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=2)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=3)
- konstant / constant (N=24)
- neu / nouveau (N=8)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 24 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie







Hipparchia genava

Walliser Waldportier
Sylvandre helvétique

Status (RL CH / Prio):	VU / -
Status (RL EU):	-
UZL (Z / L):	-



THOMAS MARENT



Hipparchia fagi

Grosser Waldportier
Sylvandre

Status (RL CH / Prio):

EN / 3

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 13 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=9)
- neu / nouveau (N=4)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 10 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Hipparchia semele

Ockerbindiger Samtfalter, Rostbinde, Samtbinde
Agreste

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 13 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=6)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=4)
- konstant / constant (N=7)
- neu / nouveau (N=6)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 14 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Hipparchia statilinus

Eisenfarbiger Samtfalter
Faune

Status (RL CH / Prio):

VU / 3

Status (RL EU):

NT

UZL (Z / L):

Z




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 2 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=1)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=2)
- konstant / constant (N=0)
- neu / nouveau (N=2)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 0 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Brintesia circe

Weisser Waldportier
Silène

Nymphalidae

Status (RL CH / Prio):

NT / 3

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

L




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 39 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=7)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=17)
- konstant / constant (N=18)
- neu / nouveau (N=21)




Entwicklung / Évolution


Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Oeneis glacialis

Gletscherfalter

Chamoisé des glaciers

Status (RL CH / Prio):

LC / -

Status (RL EU):

LC

UZL (Z / L):

-




THOMAS MARENT

Vorkommen / Présence


Anzahl / Nombre 2013–2017: 37 TS

- fehlend seit 2007 / manquant depuis 2007 (N=5)
- fehlend seit 2012 / manquant depuis 2012 (N=26)
- konstant / constant (N=30)
- neu / nouveau (N=7)




Entwicklung / Évolution

Mittelwert / Moyenne 2013–2017: 3 Ind.



Höhenverbreitung / Distribution altitudinale



Phänologie / Phénologie



Anhang: Artfrequenzen in den BDM-Erhebungen

Anzahl Transekte, auf denen eine Art festgestellt wurde in der ersten, zweiten und dritten Erhebungsperiode, jeweils absolut und prozentual. Aufgeführt sind alle im BDM zulässigen Arten.

Annexe: Fréquence des espèces dans les relevés du MBD

Nombre de transects sur lesquels une espèce a été recensée lors du premier, deuxième et troisième relevé (nombre total et pourcentage). Toutes les espèces admises au MBD sont représentées avec une valeur absolue et relative.

Wissenschaftlicher Name Nom scientifique	Anzahl Transekte / Nombre de transects					
	2003–2007	2008–2012	2013–2017	2003–2007 (%)	2008–2012 (%)	2013–2017 (%)
<i>Adscita statices-Komplex</i>	65	77	79	14	17	18
<i>Aglais urticae</i>	409	409	420	91	91	93
<i>Anthocharis cardamines</i>	317	288	298	70	64	66
<i>Apatura ilia</i>	4	7	5	1	2	1
<i>Apatura iris</i>	40	34	59	9	8	13
<i>Aphantopus hyperantus</i>	238	256	262	53	57	58
<i>Aporia crataegi</i>	146	161	164	32	36	36
<i>Araschnia levana</i>	110	121	134	24	27	30
<i>Argynnis adippe</i>	114	130	119	25	29	26
<i>Argynnis aglaja</i>	182	186	187	40	41	42
<i>Argynnis niobe</i>	112	111	103	25	25	23
<i>Argynnis paphia</i>	242	276	283	54	61	63
<i>Aricia agestis-Komplex</i>	126	168	176	28	37	39
<i>Aricia eumedon</i>	71	83	84	16	18	19
<i>Aricia nicias</i>	5	6	2	1	1	< 1
<i>Boloria aquilonaris</i>	5	4	1	1	1	< 1
<i>Boloria dia</i>	47	34	29	10	8	6
<i>Boloria euphrosyne</i>	196	196	183	44	44	41
<i>Boloria napaea-Komplex</i>	105	98	105	23	22	23
<i>Boloria selene</i>	64	68	78	14	15	17
<i>Boloria thore</i>	34	31	37	8	7	8
<i>Boloria titania</i>	132	126	119	29	28	26
<i>Brenthis daphne</i>	26	35	45	6	8	10
<i>Brenthis ino</i>	67	71	70	15	16	16
<i>Brintesia circe</i>	30	36	39	7	8	9
<i>Cacyreus marshalli</i>	5	6	12	1	1	3
<i>Callophrys rubi</i>	146	123	151	32	27	34
<i>Carcharodus alceae</i>	32	36	56	7	8	12
<i>Carcharodus floccifera</i>	3	4	8	1	1	2
<i>Carcharodus lavatherae</i>	1	2	2	< 1	< 1	< 1
<i>Carterocephalus palaemon</i>	95	109	110	21	24	24
<i>Celastrina argiolus</i>	106	114	136	24	25	30
<i>Coenonympha arcania</i>	22	21	24	5	5	5
<i>Coenonympha gardetta-Komplex</i>	118	116	120	26	26	27
<i>Coenonympha glycerion</i>	6	4	2	1	1	< 1
<i>Coenonympha pamphilus</i>	255	285	301	57	63	67
<i>Coenonympha tullia</i>	1	1	1	< 1	< 1	< 1
<i>Colias croceus</i>	188	209	228	42	46	51
<i>Colias hyale-Komplex</i>	223	232	230	50	52	51
<i>Colias palaeno</i>	56	58	53	12	13	12
<i>Colias phicomone</i>	76	85	78	17	19	17

Wissenschaftlicher Name Nom scientifique	Anzahl Transekte / Nombre de transects					
	2003–2007	2008–2012	2013–2017	2003–2007 (%)	2008–2012 (%)	2013–2017 (%)
<i>Cupido alcetas</i>	18	29	48	4	6	11
<i>Cupido argiades</i>	14	59	101	3	13	22
<i>Cupido minimus</i>	178	171	181	40	38	40
<i>Cupido osiris</i>	4	5	4	1	1	1
<i>Erebia aethiops</i>	151	146	163	34	32	36
<i>Erebia albertanus</i>	43	47	56	10	10	12
<i>Erebia cassioides</i>	6	6	5	1	1	1
<i>Erebia epiphron</i>	77	81	82	17	18	18
<i>Erebia eriphyle</i>	17	13	16	4	3	4
<i>Erebia euryale</i>	132	150	146	29	33	32
<i>Erebia flavofasciata</i>	4	3	4	1	1	1
<i>Erebia gorge</i>	60	59	55	13	13	12
<i>Erebia ligea</i>	182	172	183	40	38	41
<i>Erebia manto</i>	64	52	57	14	12	13
<i>Erebia medusa</i>	69	70	71	15	16	16
<i>Erebia melampus</i>	119	129	123	26	29	27
<i>Erebia meolans</i>	48	47	42	11	10	9
<i>Erebia mnestra</i>	37	34	35	8	8	8
<i>Erebia montana</i>	76	79	77	17	18	17
<i>Erebia oeme</i>	55	56	56	12	12	12
<i>Erebia pandrose</i>	69	73	69	15	16	15
<i>Erebia pharte</i>	64	69	64	14	15	14
<i>Erebia pluto</i>	25	22	26	6	5	6
<i>Erebia pronoe</i>	43	42	44	10	9	10
<i>Erebia styx</i>	2	1	0	< 1	< 1	0
<i>Erebia sudetica</i>	1	1	1	< 1	< 1	< 1
<i>Erebia triaria</i>	13	7	7	3	2	2
<i>Erebia tyndarus</i>	104	100	95	23	22	21
<i>Erynnis tages</i>	158	175	189	35	39	42
<i>Euchloe simplonia</i>	9	4	5	2	1	1
<i>Euphydryas aurinia</i>	76	73	56	17	16	12
<i>Euphydryas cynthia</i>	24	34	25	5	8	6
<i>Euphydryas intermedia</i>	8	10	10	2	2	2
<i>Glaucopteryx alexis</i>	9	8	15	2	2	3
<i>Gonepteryx rhamni</i>	173	179	271	38	40	60
<i>Hamearis lucina</i>	51	49	51	11	11	11
<i>Hesperia comma</i>	160	166	177	36	37	39
<i>Heteropterus morpheus</i>	8	9	11	2	2	2
<i>Hipparchia fagi</i>	11	8	13	2	2	3
<i>Hipparchia genava</i>	7	2	6	2	< 1	1
<i>Hipparchia semele</i>	13	15	13	3	3	3
<i>Hipparchia statilinus</i>	1	2	2	< 1	< 1	< 1
<i>Hyponephele lycaon</i>	12	10	11	3	2	2
<i>Inachis io</i>	176	218	205	39	48	46
<i>Iolana iolas</i>	0	1	2	0	< 1	< 1
<i>Iphiclydes podalirius</i>	26	24	27	6	5	6
<i>Issoria lathonia</i>	120	131	141	27	29	31
<i>Lampides boeticus</i>	7	2	2	2	< 1	< 1
<i>Lasiommata maera</i>	192	196	207	43	44	46

Wissenschaftlicher Name Nom scientifique	Anzahl Transekte / Nombre de transects					
	2003–2007	2008–2012	2013–2017	2003–2007 (%)	2008–2012 (%)	2013–2017 (%)
<i>Lasiommata megera</i>	145	191	227	32	42	50
<i>Lasiommata petropolitana</i>	98	116	110	22	26	24
<i>Leptidea sinapis-Komplex</i>	204	234	241	45	52	54
<i>Libythea celtis</i>	2	1	1	< 1	< 1	< 1
<i>Limenitis camilla</i>	89	104	126	20	23	28
<i>Limenitis populi</i>	5	4	3	1	1	1
<i>Limenitis reducta</i>	2	1	3	< 1	< 1	1
<i>Lopinga achine</i>	5	5	6	1	1	1
<i>Lycaena alciphron</i>	13	14	12	3	3	3
<i>Lycaena helle</i>	8	4	7	2	1	2
<i>Lycaena hippothoe</i>	98	109	98	22	24	22
<i>Lycaena phlaeas</i>	65	97	113	14	22	25
<i>Lycaena tityrus</i>	152	179	178	34	40	40
<i>Lycaena virgaureae</i>	88	86	83	20	19	18
<i>Maculineaalcon-Komplex</i>	10	10	8	2	2	2
<i>Maculinea arion</i>	90	121	107	20	27	24
<i>Maculinea nausithous</i>	6	6	6	1	1	1
<i>Maculinea teleius</i>	5	5	4	1	1	1
<i>Maniola jurtina</i>	289	289	318	64	64	71
<i>Melanargia galathea</i>	246	262	276	55	58	61
<i>Melitaea asteria</i>	3	4	5	1	1	1
<i>Melitaea athalia</i>	148	144	148	33	32	33
<i>Melitaea aurelia</i>	3	4	4	1	1	1
<i>Melitaea cinxia</i>	19	11	14	4	2	3
<i>Melitaea deione</i>	1	1	1	< 1	< 1	< 1
<i>Melitaea diamina</i>	120	117	131	27	26	29
<i>Melitaea didyma</i>	14	12	14	3	3	3
<i>Melitaea parthenoides</i>	8	11	9	2	2	2
<i>Melitaea phoebe</i>	28	31	27	6	7	6
<i>Melitaea varia</i>	17	17	14	4	4	3
<i>Minois dryas</i>	29	24	32	6	5	7
<i>Neozephyrys quercus</i>	11	5	8	2	1	2
<i>Neptis rivularis</i>	4	5	5	1	1	1
<i>Nymphalis antiopa</i>	32	29	47	7	6	10
<i>Nymphalis polychloros</i>	36	18	21	8	4	5
<i>Ochlodes venata</i>	242	263	302	54	58	67
<i>Oeneis glacialis</i>	43	37	37	10	8	8
<i>Papilio machaon</i>	237	211	227	53	47	50
<i>Pararge aegeria</i>	283	291	300	63	65	67
<i>Parnassius apollo</i>	75	75	67	17	17	15
<i>Parnassius mnemosyne</i>	17	17	15	4	4	3
<i>Parnassius phoebus</i>	44	30	28	10	7	6
<i>Pieris brassicae</i>	264	264	266	59	59	59
<i>Pieris napi-Komplex</i>	400	404	415	89	90	92
<i>Pieris rapae-Komplex</i>	384	402	394	85	89	88
<i>Plebeius argus</i>	30	31	27	7	7	6
<i>Plebeius glandon</i>	35	35	32	8	8	7
<i>Plebeius idas</i>	35	41	40	8	9	9
<i>Plebeius optilete</i>	34	36	36	8	8	8

Wissenschaftlicher Name Nom scientifique	Anzahl Transekte / Nombre de transects					
	2003–2007	2008–2012	2013–2017	2003–2007 (%)	2008–2012 (%)	2013–2017 (%)
<i>Plebeius orbitulus</i>	37	41	47	8	9	10
<i>Polygonia c-album</i>	246	229	259	55	51	58
<i>Polyommatus amandus</i>	7	4	5	2	1	1
<i>Polyommatus bellargus</i>	99	97	118	22	22	26
<i>Polyommatus coridon</i>	128	133	133	28	30	30
<i>Polyommatus damon</i>	28	31	29	6	7	6
<i>Polyommatus daphnis</i>	1	2	1	< 1	< 1	< 1
<i>Polyommatus dorylas</i>	28	36	36	6	8	8
<i>Polyommatus eros</i>	26	37	35	6	8	8
<i>Polyommatus escheri</i>	3	4	5	1	1	1
<i>Polyommatus icarus</i>	318	332	349	71	74	78
<i>Polyommatus semiargus</i>	272	299	329	60	66	73
<i>Polyommatus thersites</i>	26	19	12	6	4	3
<i>Pontia callidice</i>	41	35	37	9	8	8
<i>Pontia edusa</i>	3	6	7	1	1	2
<i>Pseudophilotes baton</i>	16	16	19	4	4	4
<i>Pyrgus alveus-Komplex</i>	148	160	179	33	36	40
<i>Pyrgus carthami</i>	3	2	1	1	< 1	< 1
<i>Pyrgus malvae-Komplex</i>	143	152	173	32	34	38
<i>Pyronia tithonus</i>	14	14	19	3	3	4
<i>Satyrium acaciae</i>	1	1	0	< 1	< 1	0
<i>Satyrium ilicis</i>	1	2	2	< 1	< 1	< 1
<i>Satyrium pruni</i>	3	1	1	1	< 1	< 1
<i>Satyrium spini</i>	5	6	4	1	1	1
<i>Satyrium w-album</i>	33	22	40	7	5	9
<i>Satyrus ferula</i>	17	20	17	4	4	4
<i>Scolitantides orion</i>	3	11	9	1	2	2
<i>Spialia sertorius</i>	64	62	67	14	14	15
<i>Thecla betulae</i>	11	13	20	2	3	4
<i>Thymelicus acteon</i>	0	1	3	0	< 1	1
<i>Thymelicus lineola</i>	151	160	192	34	36	43
<i>Thymelicus sylvestris</i>	191	190	220	42	42	49
<i>Vanessa atalanta</i>	363	344	409	81	76	91
<i>Vanessa cardui</i>	311	243	334	69	54	74
<i>Zygaena carniolica</i>	7	8	12	2	2	3
<i>Zygaena ephialtes</i>	2	6	7	< 1	1	2
<i>Zygaena exulans</i>	59	57	53	13	13	12
<i>Zygaena fausta</i>	4	5	8	1	1	2
<i>Zygaena filipendulae</i>	140	164	180	31	36	40
<i>Zygaena lonicerae</i>	72	74	90	16	16	20
<i>Zygaena loti</i>	58	55	55	13	12	12
<i>Zygaena minos</i>	2	3	0	< 1	1	0
<i>Zygaena osterodensis</i>	5	5	6	1	1	1
<i>Zygaena purpuralis</i>	55	61	60	12	14	13
<i>Zygaena romeo</i>	2	10	9	< 1	2	2
<i>Zygaena transalpina</i>	101	104	111	22	23	25
<i>Zygaena trifolii</i>	0	1	1	0	< 1	< 1
<i>Zygaena viciae</i>	20	19	19	4	4	4

