NAWA TREND BIOLOGIE

2. Kampagne (2015)









Fachbericht MAKROPHYTEN

Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)

FEBRUAR 2017

Datum Entwurf: 18.01.2017 Endfassung: 10.04.2017





Impressum

Auftraggeber: Bundesamt für Umwelt BAFU · Abteilung Wasser CH-3003 Bern

Das BAFU ist ein Amt des Eidg. Departements für Umwelt, Ver-

kehr, Energie und Kommunikation (UVEK).

Auftragnehmer: AquaPlus AG Gotthardstrasse 30 · CH-6300 Zug

Projektleitung: AquaPlus, Joachim Hürlimann

Mitarbeiter: AquaPlus, Ernst Roth

(Koordination, Feldaufnahmen, Auswertung und Bericht)

FUB AG, Niklaus Müller (Feldaufnahmen)

Hinweis: Dieser Bericht wurde im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt

(BAFU) verfasst. Für den Inhalt ist allein der Auftragnehmer ver-

antwortlich.

Foto Titelseite: Lorze, Frauental am 11.8.2015 (ID-075-ZG)







Inhaltsverzeichnis

	Se	ite
	Zusammenfassung	1
1.	Ausgangslage, Auftrag und Ziel	2
2.2. 2.3.	Grundlagen, Methodik und Vorgehen Grundlagen / Datenerhebung. Methodik Vorgehen Qualitätssicherung	3 5 8
3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.	Resultate Bewertung der Vegetationsgemeinschaft nach der Zürcher Methode Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt Rote Listen Arten Neophyten Bewertung der Ökomorphologie Informationen zu den Probenahmestellen Witterungsverhältnisse	11 16 18 19 22 24
4.2. 4.3. 4.4.	Diskussion Vorbereitungsphase Feldarbeit Bewertung der Vegetationsgemeinschaft nach der Zürcher Methode Vergleich der Aufnahmen 2012 und 2015 Bewertung der Ökomorphologie Stufe F	27 27 27 28
	Empfehlungen Vorbereitungsphase Feldarbeit	33
6.	Fazit	34
7.	Literaturverzeichnis	35
8	Glossar	36





Anhang

- A Liste der Probenahmestellen
- **B Liste der Auswertungen (Resultate_Mastertabelle)**
- C Bewertungen aus den Jahren 2012 und 2015
- D Taxaliste mit Angabe der Fundhäufigkeit
- **E Stelleninformationen**
- F Feldprotokolle und Fotos aller Stellen

Elektronische Beilagen

In elektronischer Form:

Mastertabelle gemäss Vorgabe Los 4:

7023 15_BP003 Mastertabelle_MAK_v2_20160418.xlsx

Zusammenstellung sämtlicher Felddaten und Resultate:

CH_2015_MAK_DatenAuswertung.xlsx

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Liste der Auftragnehmer sowie ausführenden Unternehmungen und c	
Anzahl der zu beprobenden Fliessgewässerabschnitte pro Kanton (siehe auc	
Abbildung 1).	
Tabelle 2: Aspekte der Qualitätssicherung	
Tabelle 3: Liste der gefährdeten Pflanzen (Gefässpflanzen und Moose)	
Tabelle 4: Neophyten im aquatischen Bereich.	
Tabelle 5: Neophyten im Uferbereich.	
Tabelle 6: Vergleichende Auflistung der Bewertungen der Jahre 2012 und 2015	
[].	28
Tabelle 7: Liste der Gefässpflanzen und Mosse, welche 2012 oder 2015 an mehr	
als 5 Stellen aufgenomen wurden.	
Tabelle 8: Die Häufigsten Taxa aufgetragen gegen die Messstellen (ID).	30
Tabelle 9: Glossar, Definition der wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit	
Makrophyten	36
A11711	
Abbildungsverzeichnis	
Abbildung 1: NAWA Probenahmenstellen 2015. Liste der Probenahmestellen mi	t
der ID siehe Anhang A	
Abbildung 2: Bestimmung des Vegetationstypes anhand von abiotischen	
Parametern [4].	5
Abbildung 3: Bewertungsschema Moosbach [4].	
Abbildung 4: Bewertungsschema Helophytenbach [4].	
Abbildung 5: Bewertungsschema Submersenbach [4].	
Abbildung 6: Bewertungsschema Schwimmblattbach [4].	
Abbildung 7: Resultate der Bewertung der Markrophytengemeinschaften anhan-	
der Zürcher Methode vor der Plausibilisierung. Die Farben zeigen die	u
Bewertungsklasse der Vegetation an einem Fliessgewässerabschnitt auf	11
Abbildung 8: Die Bewertung der Vegetation an den erhobenen	
Fliessgewässerabschnitten pro Bachtyp vor der Plausibilisierung.	





Prozentangaben über den Säulen: Anteil pro Vegetationstyp an den 81	
untersuchten Abschnitten.	12
Abbildung 9: Resultate der Bewertung der Markrophytengemeinschaften anhar	nd
der Zürcher Methode nach der Plausibilisierung. Die Farben zeigen die	
Bewertungsklassen der Vegetation an einem Fliessgewässerabschnitt auf	13
Abbildung 10: Die Bewertung der Vegetation an den erhobenen	
Fliesgewässerabschnitten pro Bachtyp nach der Plausibilisierung.	
Prozentangabe über den Säulen: Anteil und Anzahl pro Vegetationstyp der	
81 untersuchten Stellen	14
Abbildung 11: Plausibilisierung: Anzahl der Abschnitte, welche von einem	
Fliessgewässertyp in einen anderen umgeteilt wurden	
Abbildung 12: Statistische Werte der Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt.	
Abbildung 13: Total Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt aufgeteilt in Moc	
und Andere	
Abbildung 14: Übersichtskarte der Vorkommen von Rote Liste Arten	18
Abbildung 15: Übersichtskarte der Vorkommen von invasiven Neophyten der	
Schwarzen Liste	19
Abbildung 16: Übersicht der Anzahl Neophyten im Uferbereich an den	
Probenahmestellen	21
Abbildung 17: Bewertung der Ökomorphologie an den NAWA	
Fliessgewässerabschnitten nach Stufe F [2].	22
Abbildung 18: Die Anzahl Probenahmestellen pro Bewertungsklasse der	
Ökomorphologie auf Stufe F	23
Abbildung 19: Anzahl der Probenahmestellen, bei welchen die Beprobung durc	
einen der dargestellten Faktoren beeinflusst war.	24
Abbildung 20: Abweichung der Niederschlagsmengen im August 2015 vom	
langjährigen Mittel 1981 - 2010	25
Abbildung 21: Monatsmittel der Abflussmengen von 2015 und deren	
Abweichung von den langjährigen Mitteln am Beispiel von vier verschieder	
Fliessgewässern	26
Abbildung 22: Vergleichende Darstellung der Bewertungsklassen der	
Ökomorphologie der Jahre 2012 und 2015.	32
Abbildung 23: Kiesabbaugebiet bei der Stelle ID_056_BE, Engstlige in Frutigen.	
(Quelle: Geoportal des Kantons Bern, 21.12.2016)	33





Zusammenfassung

Auftrag

Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) wurden zwischen Juni und September 2015 an 81 Fliessgewässerabschnitten die Makrophyten erhoben. In den Kantonen Neuenburg und Waadt wurden die Aufnahmen durch die Firma Biol'EAU (Bernex GE) durchgeführt. Der Kanton Zürich hat die Daten selber erhoben. Der Projektablauf war in 4 Meilensteinen (Vorbereitung MS-1, Datenerhebung MS-2, Datenauswertung MS-3 und Berichterstattung MS-4) gegliedert. Die Meilensteine MS-1 bis MS-3 wurden je mit einem Zwischenbericht abgeschlossen. Der Meilenstein 4 markiert den Abschluss dieses Auftrages.

Datenauswertung

Die Felddaten wurden durch den Auftragnehmer auf deren Konsistenz überprüft und sichergestellt, dass sämtliche für die Auswertung erforderlichen Daten vorliegen. Die Auswertung der Daten erfolgte gemäss der Methode des Kantons Zürich [1]. Jeder Fliessgewässerabschnitt wird anhand der abiotischen Parameter Beschattung, Gefälle, Abfluss und mittlere Wassertiefe einen Fliessgewässertyp zugeordnet. Moosbach, Submersenbach, Helophytenbach, Schwimmblattbach und vegetationsarmer Bach. Die Bewertung findet auf der Ebene der Standortgerechtigkeit und der Vielfalt statt und wird zu einem Schlussresultat aggregiert. Nach der Plausibilisierung wurden insgesamt 6 Abschnitte als «sehr gut» (7.4%), 18 Abschnitte als «gut» (22.2%), 11 als «mässig» (13.6%) und 10 als «schlecht» (12.4%) bewertet. 36 (44%) Stellen wurden den vegetationsarmen Bächen zugewiesen und bleiben als solche unbewertet (siehe **Abbildung 9**).

Rote Liste Arten

Drei Moosarten der Roten Liste der gefährdeten Moosarten werden als stark gefährdet (das sichelblättrige Gitterzahnmoos (*Cinclidotus aquaticus*) und das schlanke Spaltzahnmoos (*Fissidens rufulus*)) und oder verletzlich (der FlussStumpf-deckel (*Amblystegium fluviatile*) eingestuft. Hinzu kommt eine Gefässpflanze, welche in der Roten Liste der Gefässpflanzen als verletzlich eingestuft wird. Das grosse Süssgrass (*Glyceria maxima*).

Neophyten

Insgesamt wurden 2 rein aquatische Neophyten aufgenommen. Die Kanadische Wasserpest (*Elodea canadensis*) wurde an zwei Stellen erfasst und Nuttalls Wasserpest (*Elodea nuttallii*) an drei Stellen. Bei Beiden handelt es sich um Arten der Schwarzen Liste der invasiven Neophyten [8].







1. Ausgangslage, Auftrag und Ziel

Der vorliegende Bericht ist Bestandteil des Projektes NAWA TREND [1] [2]. Er beinhaltet den Teil Makrophyten der zweiten Untersuchungskampagne des Jahres 2015. Analog zu diesem Fachbericht werden die anderen Biologiemodule Fische, Makrozoobenthos und Diatomeen auch mit Fachberichten abgehandelt. Im Pflichtenheft zur Offerte zum Teil Makrophyten wird folgende Ausgangslage und Formulierung des Auftrages aufgeführt [3]:

"Das Gewässerschutzgesetz (GSchG) verpflichtet den Bund und die Kantone in Art. 50, die Auswirkungen von Gewässerschutzmassnahmen zu prüfen und die Öffentlichkeit über den Zustand der Gewässer zu informieren. Art. 57 verpflichtet den Bund, Erhebungen von gesamtschweizerischem Interesse, u.a. über die Wasserqualität der oberirdischen Gewässer durchzuführen. Der Vollzug der für den Gewässerschutz erforderlichen Erhebungen wird gemäss Art. 58 den Kantonen übertragen, welche die Ergebnisse den Bundesstellen mitzuteilen haben.

Die Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA) soll die folgenden Ziele erreichen:

- Basis für einen mittel- und langfristigen Überblick über den Zustand der Oberflächengewässer in der Schweiz und dessen Entwicklung.
- Einfache, einheitliche und über die ganze Schweiz vergleichbare Übersicht über den Zustand der Oberflächengewässer.
- Bereitstellen von Grundlagen für die Früherkennung problematischer Entwicklungen und zur Steuerung der nationalen Gewässerschutzpolitik.
- Bereitstellen eines einheitlichen Datenpools für vertiefte Analysen.
- Erfolgskontrolle von heutigen und zukünftigen Massnahmen im Gewässerschutz und anderen Politikbereichen."

Gegenstand dieses Auftrages sind die Koordination der Makrophyten-Erhebungen des Jahres 2015, die Probenahmen, die Bestimmung der Makrophyten, die Qualitätssicherung sowie die Berichterstattung im Sinne eines Fachberichtes.

Mit dem vorliegenden Bericht werden die folgenden Aspekte abgehandelt:

- Auflisten der durchgeführten T\u00e4tigkeiten (angewandte Methode, Vorgehen),
- Besprechung der Resultate,
- Erläuterungen zur Qualitätssicherung,
- Auswertung der Resultate des Jahres 2015 gemäss der angepassten Zürcher Methode, der Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt, der Arten der Roten Liste und der Neophyten, sowie der Ökomorphologie
- Vergleiche der Resultate des Jahres 2015 mit denjenigen der früheren Erhebungen der Jahre 2011-2014,
- Fazit und Vorschläge für die nächste Erhebungsphase.







2. Grundlagen, Methodik und Vorgehen

2.1. Grundlagen / Datenerhebung

Gemäss dem Pflichtenheft vom 28. Mai 2014 sollte die Makrophytengemeinschaft an den zu beprobenden 81 Stellen (**Abbildung 1**, **Tabelle 1**, **Anhang A**) gemäss der Methode des Kantons Zürich [4] erhoben werden. Die Schweizerische Methode befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase. Im Vorfeld der Feldsaison wurde die Erhebungsmethodik an den Qualitätsworkshops vom 12.05.2015 (Zürich, Glattpark) und 28.05.2015 (Yverdon–les–Bains) erläutert und den die Probenahmen durchführenden Personen vorgestellt. Die Feldaufnahmen wurden gemäss der sich in der Entwicklungphase befindenden Schweizerischen Methode gemacht. Diese weicht in den folgenden Bereichen von der Zürcher Methode [4] ab:

- Erfassung von kontinuierlichen Werte anstelle von Klassen für Abfluss, Gefälle, Beschattung und Gesamtdeckung
- Erfassung der Taxa mit absoluter Deckung anstelle von relativer Häufigkeit
- Erfassung der Sicherheit (Unsicherheit) der Bestimmung eines Taxons
- Erfassung von terrestrischen Neophyten im Uferbereich
- Die absolute Deckung von Moosen und f\u00e4digen Gr\u00fcnalgen werden als Totalwerte erfasst




Abbildung 1: NAWA Probenahmenstellen 2015. Liste der Probenahmestellen mit der ID siehe Anhang A.







Zusammen mit der Methodik wurde an den Workshops eine Taxaliste präsentiert, welche als Grundlage für die Probenahme und die Auswertung berücksichtigt werden musste (siehe Anhang D).

Die Aufnahmen an den 81 Fliessgewässerabschnitten wurden im vorgegebenen Zeitfenster in den Monaten Juni 2015 bis September 2015 durchgeführt. Nebst der Vegetationsgemeinschaft wurden, gemäss Feldprotokoll, abiotische Parameter und Parameter zur Bewertung der Ökomorphologie erhoben. Im Anschluss an die Feldarbeit wurden sämtliche Felddaten zusammengeführt, auf deren Konsistenz überprüft, digitalisiert und am Ende des Meilensteines 2 dem Auftraggeber übergeben. Je zwei Fotos der Probenahmestellen ergänzen den Datensatz pro Fliessgewässerabschnitt (siehe Anhang F).

Tabelle 1: Liste der Auftragnehmer sowie ausführenden Unternehmungen und die Anzahl der zu beprobenden Fliessgewässerabschnitte pro Kanton (siehe auch Abbildung 1).

A 6: 1	A ("I I	17 .	
Auftragnehmer	Ausführende	Kanton	Anzahl
	Unternehmung		Stellen
AquaPlus AG, Zug	AquaPlus AG, Zug	AG	8
		BE	13
		BL	1
		BS	1
		FR	2
	•	JU	5
	•	LU	3
	•	NW	1
	•	OW	1
	•	SO	3
		SZ	1
		ZG	2
	FUB, Rapperswil	Al	1
•		AR	1
	•	GR	1
	•	SG	5
	•	TG	4
	•	TI	3
Kanton Neuenburg	Biol'EAU, Bernex	NE	2
Kanton Waadt	Biol'EAU, Bernex	VD	10
Kanton Zürich	Kanton Zürich	ZH	13
Total Stellen			81

2.2. Methodik

Die Datenerhebung und -Auswertung erfolgte gemäss der Zürcher Methode [4]. In einem ersten Schritt wird anhand der abiotischen Parameter der Vegetationstyp bestimmt. Die Methode unterscheidet zwischen Schwimmblatt-, Moos-, Helophyten-, Submersen- und vegetationsarmem Bach. Die **Abbildung 2** zeigt das Typisierungsschema mit den dazu verwendeten abiotischen Parametern. Die Werte von Gefälle und Abfluss der NAWA Stellen wurden vom Auftraggeber für die Typisierung zur Verfügung gestellt und dienten zur Plausibilisierung der im Feld erhobenen Werte.




Abbildung 2: Bestimmung des Vegetationstypes anhand von abiotischen Parametern [4].

Für jeden Vegetationstyp beschreibt die Methode ein zweiteiliges Bewertungsschema. Die Standortgerechtigkeit und die Vielfalt. Die Standortgerechtigkeit bewertet die Zusammensetzung der unterschiedlichen Wuchsformen (Moose, Submerse, Helophyten und Schwimmblattpflanzen) an einem Fliessgewässer-abschnitt und die Vielfalt den Artenreichtum. Der Artenreichtum wird entweder durch die reine Anzahl Arten (Moosbach) oder im Zusammenhang mit Mindestdeckungsgraden und der Dominanz von einzelnen Arten bewertet. Die beiden Teilergebnisse werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. In den folgenden Abbildungen sind die Bewertungsschemata aufgezeichnet (Abbildung 3, Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6)

Bewertung Moosbach




Abbildung 3: Bewertungsschema Moosbach [4].




Abbildung 4: Bewertungsschema Helophytenbach [4].







Bewertung Submersenbach




Abbildung 5: Bewertungsschema Submersenbach [4].

Bewertung Schwimmblattbach




Abbildung 6: Bewertungsschema Schwimmblattbach [4].



2.3. Vorgehen

Der Auftrag war in 4 Meilensteine (MS) aufgeteilt und umfasste folgende Termine und Aufgaben:

Meilenstein 1 - Projektvorbereitung

Startsitzung mit allen Losen: 13.01.2015

Abschlusstermin: 31.05.2015

- Absprache und Kommunikation
- Vorbereitung der Probenahmen
- Organisation und Durchführung je eines Workshops in der Deutsch Schweiz und in der Romandie
- Planung der Feldarbeit und weitere Planung Periode Meilenstein 2
- Information der Kantonalen Fachstellen bezüglich der bevorstehenden Feldaufnahmen

Meilenstein 2 - Feldarbeit

Abschlusstermin: 31.10.2015 Abschlusssitzung: 10.11.2015

- Durchführung der Probenahmen im Zeitfenster Juni 2015 bis September 2015
- Qualitätssicherung
- Aufbereitung der Daten

Meilenstein 3 - Datenverarbeitung

Abschlusstermin: 30.04.2016 Abschlusssitzung: 26.04.2016

- Einholen und Validierung der Daten und Proben bei den Kantonen
- Digitalisierung der Felddaten
- Aktualisierung der Taxalisten und Erstellen einer Übersicht zu den dokumentierten Änderungen
- Vor- & Aufarbeitung der Resultate für den Fachbericht
- Detaillierte Auswertungen der Ergebnisse inklusive Dokumentation
- Darstellung der Resultate
- Qualitätssicherung

Meilenstein 4 – Auswertung und Berichterstattung

Abschlusstermin: 28.02.2017 Abschlusssitzung: 31.01.2017

- Erstellen des Fachberichtes
- Auswertung, Darstellung und Interpretation der Daten
- Integrierung der Erhebungen der Kantone (NE, VD, ZH) in den Gesamtdatensatz
- Qualitätssicherung

Die Meilensteine 1, 2, 3 und 4 wurden termingerecht abgeschlossen und die dazugehörigen Berichte und Ergebnisse erbracht und vom Auftraggeber genehmigt.







2.4. Qualitätssicherung

In der **Tabelle 2** sind die durchgeführten Arbeiten der Qualitätssicherung pro Meilenstein aufgeführt.

Tabelle 2: Aspekte der Qualitätssicherung

Ası	pekte	Meilensteine
•	Einhaltung der Vorgaben betreffend Probenahmemethodik	1,2,3
•	Planung und Durchführung eines Qualitätssicherungs Workshops, welcher zum Ziel hat die Einhaltung und Anwendung der Methodik zur Probenahme zu garantieren.	1
•	Zweit– und Nachbestimmungen von Moosen und Characeen	2
•	Methodische Rückfragen der Kantone be- antworten	2
•	Plausibilisierung der erhobenen Felddaten	3
•	Plausibilisierung der Resultate durch die kantonalen Fachstellen / Probenehmer	3
•	Rückmeldungen zur Methodik wurden durch die «Taskforce Makrophyten» zusammengetragen.	3

Startsitzung - Kick off

Am 13. Januar 2015 fand die Kick off Sitzung für alle Lose gemeinsam beim BAFU in Bern statt. Anlässlich dieser Sitzung haben die Losverantwortlichen zusammen mit dem Auftraggeber Ziele für den ganzen Projektablauf und die Projektkoordination (Los 4) definiert. Ein geradliniger reibungsloser Projektablauf hinsichtlich Terminen, Datenqualität und Effizienz ist für alle von höchster Priorität und wurde als für alle verbindlich betrachtet.

Workshops

Der Grundstein für die Qualitätssicherung wurde mit den Workshops im Vorfeld der Feldaufnahmen gelegt. Auftraggeber, Auftragnehmer und Fachleute trafen sich anlässlich zwei Workshops in Zürich am 12.05.2015 und in Yverdon-les-Bains am 28.05.2015. Der Schwerpunkt der beiden Workshops lag bei der Probenahmemethodik, welche in Rahmen der Methodenentwicklung angepasst wurde. Zudem wurde die Probenahme von Moosen durch Experten der FUB AG instruiert. Der Praxisteil am Nachmittag ermöglichte einen aktiven Austausch unter den Experten im Rahmen einer Feldaufnahme.

Zeitfenster für die Feldarbeit

Der Auftraggeber hat für die Feldaufnahmen das Zeitfenster Juni bis September bestimmt. Sämtliche Aufnahmen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt.

Nach- und Zweitbestimmungen

Sämtliche Moose wurden durch Fachspezialisten der Firma FUB AG (Norbert Schnyder, Niklaus Müller) bestimmt oder verifiziert. Die Characeen der Reuss und der Sarneraa wurden ebenfalls von einem Fachspezialisten von AquaPlus (Matthias Sturzenegger) bestimmt.

Methodik







Die Feldaufnahmen wurden in Absprache mit dem Auftraggeber mit einer leicht angepassten Methodik durchgeführt. Die Anpassungen betreffen den Abfluss, das Gefälle und die Beschattung. Diese Werte werden neu mit kontinuierlichen Werten an Stelle von Klassen erhoben. Des Weiteren wurden bei der Aufnahme der Taxa in vier Klassen (1-4) protokolliert, wie sicher deren Bestimmung ist. Zudem werden terrestrische Neophyten im Uferbereich erhoben. Die Aufnahmemethodik ist verständlich und es werden die benötigten Daten festgehalten um einen Fliessgewässerabschnitt mit der Zürcher Methode zu bewerten. Zudem können, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, die Daten auch mit anderen Methoden ausgewertet werden.

Sicherheit / Vorkehrungen

Zu Sicherheitszwecken erfolgten die Feldaufnahmen an den folgenden 11 Stellen jeweils zu Zweit (siehe **Anhang E** - Stelleninformationen):

- ID_012_OW, Sarner Aa
- ID_014_LU, Reuss
- ID_020_VD, Venoge
- ID_022_VD, Broye
- ID_074_NW, Engelberger Aa
- ID_093_LU, Kleine Emme
- ID_100_SZ, Muota
- ID_126_VD, Mentue
- ID_128_VD, Promenthouse
- ID 129 VD, Boiron
- ID_130_VD, Aubonne

Dokumentation von Stellenverschiebungen

Infolge Bauarbeiten wurden die Stellen ID_093_LU (Kleine Emme) und ID_134_BE (Birs) flussaufwärts verschoben und dokumentiert. Die Stelle ID_056_BE (Engstlige) wurde ebenfalls flussaufwärts verschoben, weil die vorgegebene Stelle durch die Tätigkeit des Kiesabbaus beeinträchtigt war.

Die genauen Koordination können dem **Anhang A** entnommen werden.







3. Resultate

3.1. Bewertung der Vegetationsgemeinschaft nach der Zürcher Methode

Resultate vor der Plausibilisierung

Die **Abbildung 7** zeigt die Übersicht der Bewertungen der Fliessgwässerabschnitte mit der Zürcher Methode **vor der Plausibilisierung**. 19 (23.5 %) Fliessgewässerabschnitte wurden anhand der abiotischen Faktoren Gefälle, Substrat, Beschattung, mittlere Tiefe und Abflussmenge als Submersenbäche und 16 (19.7 %) Abschnitte als Moosbäche typisiert. 46 (56.8 %) Abschnitte wurden als vegetationsarme Bäche typisiert und bleiben unbewertet (graue Punkte).




Abbildung 7: Resultate der Bewertung der Markrophytengemeinschaften anhand der Zürcher Methode vor der Plausibilisierung. Die Farben zeigen die Bewertungsklasse der Vegetation an einem Fliessgewässerabschnitt auf.




Abbildung 8: Die Bewertung der Vegetation an den erhobenen Fliessgewässerabschnitten pro Bachtyp vor der Plausibilisierung. Prozentangaben über den Säulen: Anteil pro Vegetationstyp an den 81 untersuchten Abschnitten.

Die **Abbildung 8** zeigt die Bewertungen pro Bachtyp und Bewertungsklasse vor der Plausibilisierung. Keiner der Fliessgewässerabschnitte wurde als Helopyhtenbachrespektive als Schwimmblattbach typisiert. Die Zahlenwerte zeigen die Anzahl Stellen und prozentuale Anteile pro Bachtyp (oberhalb der Säulen) und die Anzahl Stellen pro Bewertungsklasse innerhalb eines Bachtypes.



Resultate nach der Plausibilisierung

Die **Abbildung 9** zeigt die Übersicht der Bewertungen der einzelnen Fliessgewässerabschnitte mit der Zürcher Methode nach der Plausibilisierung. 36 der 81 Fliessgewässerabschnitte wurden als vegetationsarmer Bach typisiert (graue Punkte) und bleiben als solche unbewertet. Der Zustand der Vegetation wurde an 10 Stellen als «schlecht», an 11 Stellen als «mässig» und an 18 Stellen als «gut» bewertet. Als «sehr gut» wurden die Stellen ID_009_SO (Lympach), ID_034_AG (Bünz), ID_054_FR (Sionge), ID_065_ZH (Sihl), ID_116_LU (Ron) und ID_134_BE (Birs) bewertet.




Abbildung 9: Resultate der Bewertung der Markrophytengemeinschaften anhand der Zürcher Methode nach der Plausibilisierung. Die Farben zeigen die Bewertungsklassen der Vegetation an einem Fliessgewässerabschnitt auf.








Abbildung 10: Die Bewertung der Vegetation an den erhobenen Fliesgewässerabschnitten pro Bachtyp nach der Plausibilisierung. Prozentangabe über den Säulen: Anteil und Anzahl pro Vegetationstyp der 81 untersuchten Stellen.

Die **Abbildung 10** zeigt die Bewertungen der Fliessgewässerabschnitte. 65 % aller Stellen (n=45) konnten bewertet werden. 22.2 % wurden als Moosbach, 11.1 % als Helophytenbach und 22.2 % als Submersenbach bewertet. Von den 18 Moosbächen wurden 2 als «sehr gut», 9 als «gut», 4 als «mässig» und 3 als «schlecht» bewertet. Bei den Helopyhtenbächen wurden 4 als «sehr gut» und 5 als «gut» bewertet. Es gibt keine «mässigen» und keine «schlechte» Bewertungen bei diesem Fliessgewässertyp. Bei den Submersenbächen wurden 4 als «gut», 7 als «mässig» und ebenfalls 7 als «schlecht» bewertet. Keiner der 81 Fliessgewässerabschnitte wurde als Schwimmblattbach typisiert.

Erläuterung der Plausibilisierung

Mit dem Plausibilisierungsprozess wird in einem ersten Schritt überprüft, ob die namensgebende Wuchsform an einem Fliessgewässerabschnitt dominant in Erscheinung tritt. Ist dies nicht der Fall wird überprüft ob die abiotischen Parameter von Gefälle, Abfluss, Beschattung, mittlere Tiefe und Substrat falsch eingeschätzt wurden und so bei der Typisierung einem falschen Fliessgewässertyp zugeordnet wurde. Wurden die Parameter richtig eingeschätzt, wird überprüft ob in einem anderen Fliessgewässertyp eine «gute» oder «sehr gute» Bewertung erreicht wird. Trifft dies zu, wird der Abschnitt dem anderen Fliessgewässertyp zugewiesen und bewertet.

Abbildung 11: Plausibilisierung: Anzahl der Abschnitte, welche von einem Fliessgewässertyp in einen anderen umgeteilt wurden.

Die farbig hinterlegten Werte zeigen auf, welche Abschnitte im durch die Typisierung zugewiesenen Fliessgewässertyp belassen wurden.

	zu (Abb. 10)	vegetationsarm	Moosbach	Submersenbach	Helophytenbach	Schwimmblattbach
von (Abb. 8)						
vegetationsarm		30	6	3	7	0
Moosbach		4	11	1	0	0
Submersenbach		2	1	14	2	0
Helophytenbach		0	0	0	0	0
Schwimmblattbach		0	0	0	0	0
Total		36	18	18	9	0

In der **Abbildung 11** sind die Anzahl Stellen aufgeführt, welche im Plausibilisierungsprozess von einem Fliessgewässertyp zu einem anderen zugeteilt wurden.

Fliessgewässertyp bleibt gleich

55 Fliessgewässerabschnitte (11 Moosbäche, 14 Submersenbäche und 30 vegetationsarme Bäche) konnten in dem durch die Typisierung bestimmten Bachtyp belassen werden. Bei den Moosbächen stimmt bei 10 Abschnitten die dominante Wuchsform mit dem Fliessgewässertyp überein und bei einer Stelle ist der Deckungsgrad der Moose und Helophyten in etwa gleich. Bei 10 von den 14 Submersenbächen stimmt die Wuchsform, unter Berücksichtigung der Moose auf künstlichem Substrat, mit dem Bachtyp überein. Die anderen 4 Stellen wurden bei den Submersenbächen belassen, da sie in keinem anderen Bachtyp eine «gute» respektive «sehr gute» Bewertung erreichen.

Umteilung in einen anderen Fliessgewässertypen

Von durch die Methode als Moosbächen typisierten Fliessgewässerabschnitten wurde/n:

- bei einer Stelle die Beschattung zu hoch eingeschätzt und den Submersenbächen zugewiesen.
- 4 Stellen den vegetationsarmen Bächen zugewiesen, da bei 3 Abschnitten alle Moose auf künstlichem Substrat wachsen. An diesen Stellen kommen nebst den Moosen nur wenige Helophyten vor (absolute Deckung ≤ 1 %).

Von den durch die Methode als Submersenbäche typisierten Fliessgewässerabschnitten wurde/n:

1 Stelle (ID_085_NE Areuse) den Moosbächen zugewiesen, da diese Wuchsform dominiert und als Moosbach eine «gute» Bewertung erhält.







- 2 Stellen zu den Helophytenbächen zugewiesen. Bei einer Stelle dominieren Helophyten (ID_009_SO, Lympach) und bei der Stelle ID_088_JU (Doubs) haben die Moose und die Helophyten den gleichen Deckungsgrad. Die Stelle wird aber als Moosbach besser bewertet.
- Bei 2 Stellen sind keine submersen Wuchsformen vorhanden, die Moose dominieren, wachsen jedoch ≥ 99 % auf künstlichem Substrat.

Von den durch die Methode als vegetationsarme Bäche typisierten Fliessgewässerabschnitten wurde/n:

- 5 Stellen den Moosbächen zugewiesen, da bei diesen Stellen Moose dominieren und durch diese Zuweisung eine «gute» oder «sehr gute» Bewertung erreicht wird.
- Drei Stellen zu den Submersenbächen umgeteilt, da bei diesen die Submersen als dominante Wuchsform auftreten.
- 7 Stellen den Helophytenbächen zugewiesen. Bei 6 Stellen dominieren die Helophyten und bei der Lauche (ID_071_TG) dominieren, unter Anbetracht der auf künstlichem Substrat wachsenden Moose, ebenfalls die Helophyten. Alle Stellen werden als Helophyten «sehr gut» (Bünz ID_034_AG / Ron ID_116_LU / Birs ID_134_BE) oder «gut» (Lauche ID_071_TG / Chemibach ID_072_TG / Allaine ID_084_JU und Birs ID_087_JU) bewertet.
- 30 Fliessgewässerabschnitte in den vegetationsarmen Bächen belassen. Bei 3 Stellen ist keine Vegetation vorhanden (Engstlige ID_056_BE / Boiron ID_129_VD / La Veveyse ID_131_VD) und bei 27 Stellen dominieren zwar Moose, jedoch grösstenteils auf künstlichem Substrat.

3.2. Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt

In der **Abbildung 12** sind die statistischen Werte der Anzahl Arten pro Untersuchungsabschnitt dargestellt. Moose und Andere, wie Helophyten, Submerse, etc., sind separat dargestellt. Die Darstellung Total umfasst alle Taxagruppen.




Abbildung 12: Statistische Werte der Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt.

In der **Abbildung 12** ist zu erkennen, dass es Stellen gibt bei denen keine Vegetation vorgefunden wurde (ID_056_BE und ID_131_VD). Bei den Moosen verläuft







der Median bei 4 Taxa und bei den anderen Artengruppen bei 3 Taxa. Insgesamt beträgt der Median 8 Taxa pro Untersuchungsabschnitt. Das Maximum an Arten liegt bei 26 Taxa.




Abbildung 13: Total Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt aufgeteilt in Moose und Andere.

In der **Abbildung 13** ist die Summenkurve der Anzahl Taxa pro Untersuchungsabschnitt dargestellt. Die Moose und die anderen Wuchsformen sind farblich unterschieden. Es ist zu erkennen, dass die Moose immer in verschiedener Anzahl vorkommen. Damit sich Moose an einem Fliessgewässerabschnitt etablieren können, braucht es stabiles Substrat, welches durch Geschiebetrieb nicht bewegt wird.

An den 81 Fliessgewässerabschnitten wurden insgesamt 191 Taxa aufgenommen. 22 Gefässpflanzen wurden an 5 oder mehr Stellen erfasst. Bei den Moosen sind es 13 Taxa, welche an fünf oder mehr Stellen aufgenommen wurden. Dies sind weniger als bei der letzten Kampagne.





3.3. Rote Listen Arten

Folgende Arten der roten Liste der gefährdeten Gefässpflanzen der Schweiz [6] [7] und der gefährdeten Moose der Schweiz wurden aufgenommen (**Tabelle 3**):

Tabelle 3: Liste der gefährdeten Pflanzen (Gefässpflanzen und Moose)

Taxa	Rote Liste Status ^{3,4}	Vorkommen an Stellen
Amblystegium fluviatile	VU	CH_040_ZH (Limmat)
(Stumpfdeckel)		CH_045_ZH (Aabach)
		CH_046_ZH (Aa)
		CH_048_ZH (Jona)
		CH_050_ZH (Thur)
Cinclidotus aquaticus	EN	CH_087_JU (Birse)
(Sichelblättriges Gitter-		CH_128_VD (Promenthouse)
zahnmoos)		CH_130_VD (Aubonne)
Fissidens rufulus	EN	CH_093_LU (Kleine Emme)
(schlankes Spaltzahnmoos)		
Glyceria maxima	VU	CH_094_BE (Suze)
(Grosses Süssgras)		

Die **Abbildung 14** zeigt die Vorkommen der Rote Liste Arten an den Probenahmestellen. Der Stumpfdeckel (*Amblystegium fluviatile*) wurde nur im Kanton Zürich gefunden.




Abbildung 14: Übersichtskarte der Vorkommen von Rote Liste Arten.





3.4. Neophyten

Im benetzen Bereich wurden folgende Neophyten der Schwarzen Liste [8] gefunden (**Tabelle 4**):

Tabelle 4: Neophyten im aquatischen Bereich.

Taxa	Vorkommen an Stellen
Elodea canadensis	CH_009_SO (Limpach)
(Kanadische Wasserpest)	CH_021_VD (Thièle)
Eldodea nuttallii	CH_014_LU (Reuss)
(Nuttalls Wasserpest)	CH_049_ZH (Furtbach)
·	CH_075_ZG (Lorze)

Beide Arten gehöhren zur Familie der Frossbischgewächse (*Hydrocharitaceae*) und bevorzugen stehende bis langsam fliessende nährstoffreiche Gewässer [10]. Die Arten stammen aus Nordamerika und haben sich in ganz Mitteleuropa verbreitet. Die Vermehrung findet auf vegetativem Weg statt. Selbst kleine Sprossteile können zu einer neuen Pflanze heranwachsen.

Die **Abbildung 15** zeigt die Vorkommen der Neophyten an den Fliessgewässerabschnitten.




Abbildung 15: Übersichtskarte der Vorkommen von invasiven Neophyten der Schwarzen Liste.







Im Uferbereich wurden folgende Neophyten erfasst (Tabelle 5, Abbildung 16):

Tabelle 5: Neophyten im Uferbereich.

Таха	Vorkommen an Stellen
Ailanthus altissima	CH_002_BS (Birs)
(Götterbaum)	
Buddleya davidii	CH_060_BE (Sense)
(Sommerflieder)	CH_076_ZG (Lorze)
	CH_093_LU (Kleine Emme)
Erigeron annus	CH_002_BS (Birs)
(Einjähriges Berufskraut)	CH_094_BE (Suze)
Impatiens glandulifera	CH_022_VD (Broye)
(Drüsiges Springkraut)	CH_034_AG (Bünz)
	CH_036_AG (Sissle)
	CH_039_AG (Suhre)
	CH_060_BE (Sense)
	CH_067_BL (Ergolz)
	CH_069_JU (Scheulte)
	CH_084_JU (Allaine)
	CH_087_JU (Birse)
	CH_088_JU (Doubs)
	CH_106_BE (Saane)
	CH_114_BE (Emme)
	CH_126_VD (Mentue)
	CH_128_VD (Promenthouse)
Dhutalassa amarisana	CH_134_BE (Birs) CH_002_BS (Birs)
Phytolacca americana (Amerikanische Kermesbeere)	CH_002_B3 (Bils)
Reynoutria japonica	CH_022_VD (Broye)
(Japanischer Staudenknöterich)	CH_034_AG (Bünz)
(Supuriserier Studderikrioterieri)	CH_050_ZH (Thur)
	CH_063_BE (Langete)
	CH_076_ZG (Lorze)
	CH_087_JU (Birse)
	CH_094_BE (Suze)
	CH_106_BE (Saane)
	CH_114_BE (Emme)
	CH_126_VD (Mentue)
	CH_132_VD (Grande Eau)
	CH_134_BE (Birs)
Robinia pseudoacacia	CH_002_BS (Birs)
(Robinie)	CH_007_BE (Emme)
	CH_034_AG (Bünz)
	CH_036_AG (Sissle)
	CH_060_BE (Sense)
	CH_063_BE (Langete)
	CH_111_AG (Wigger)
Solidago canadensis	CH_022_VD (Broye)
(Kanadische Goldrute)	CH_042_ZH (Sihl)
	CH_050_ZH (Thur)
	CH_060_BE (Sense)
	CH_093_LU (Kleine Emme)
	CH_094_BE (Suze)
	CH_107_FR (Sarine)








Abbildung 16: Übersicht der Anzahl Neophyten im Uferbereich an den Probenahmestellen.

Die **Abbildung 16** zeigt die Anzahl terrestrischer Neophyten pro Probenahmestelle auf. Es wurden insgesamt acht verschiedene Neophytenarten in den Uferbereichen von 26 Probenahmestellen aufgenommen. Pro Stelle wurden zwischen 1 und 4 Arten erfasst.





3.5. Bewertung der Ökomorphologie

An jeder Probenahmestelle wurden zusammen mit den vegetationsspezifischen Daten, die für die ökomorphologische Auswertung relevanten Parameter erhoben. Anhand der Wasserspiegelbreitenvariabilität, des Verbauungsgrades der Sohle und des Böschungsfusses sowie der Breite des Uferbereiches und dessen Bewuchs wurde jeder Streckenabschnitt gemäss Modul Ökomorphologie [5] bewertet. Die Bewertungsklassen sind: «natürlich/naturnah», «wenig beeinträchtigt», «stark beeinträchtigt» und «naturfremd/künstlich». Die Kategorie «eingedolt» kommt bei diesem Projekt nicht vor, da offene Gewässerabschnitte beprobt wurden. Von den 81 Probenahmestellen wiesen 7 Abschnitte (8.6 %) die ökomorphologische Zustandsklasse «natürlich/naturnah» auf. 30 Stellen (37.0 %) wurden als «wenig beeinträchtigt» und 44 (54.4 %) als «stark beeinträchtigt» klassiert. Keine der Stellen wurde als «naturfremd/künstlich» eingestuft.

(Abbildung 17 und Abbildung 18).




Abbildung 17: Bewertung der Ökomorphologie an den NAWA Fliessgewässerabschnitten nach Stufe F [2].




Abbildung 18: Die Anzahl Probenahmestellen pro Bewertungsklasse der Ökomorphologie auf Stufe F.

3.6. Informationen zu den Probenahmestellen

Nachfolgend an die Felderhebungen haben die Probenehmer/innen Rückmeldungen betreffend der Beprobbarkeit einer Stelle hinsichtlich Zugang, Watbarkeit und Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Die Grundlagen dieser Erhebungen wurden anlässlich der NAWA Kampagne im Jahre 2012 erhoben. Die Daten wurden im Anschluss der Feldsaison 2015 von den Probenehmer/Innen verifiziert und, falls nötig, angepasst.

Der Zugang gibt Auskunft darüber von welcher Seite in Fliessrichtung die Stelle erreichbar ist. Dies ist relevant bei grösseren Gewässern, welche oft durch grosse Tiefen und/oder hohe Fliessgeschwindigkeiten geprägt sind, und aus diesem Grund oft nur am Rand beprobt werden konnten. Die Watbarkeit kann durch grosse Tiefen und Fliessgeschwindigkeiten eingeschränkt sein. Die Sicherheits-hinweise geben Auskunft darüber, ob ein Streckenabschnitt von Schwall/Sunk betroffen ist und der Kraftwerksbetreiber vor einer Beprobung informiert werden muss, respektive die Probenahme bei Sunk durchgeführt werden muss. Die oben genannten Zusatzinformationen zu den Probenahmestellen geben Auskunft über die Beprobbarkeit einer Stelle insgesamt. Diese Einschätzungen entsprechen der subjektiven Wahrnehmung der/des Probenehmerin/Probennehmers und können durch andere Personen abweichend eingeschätzt werden. Die detaillierte Bewertung jeder Stelle befindet sich in Anhang B. Die Abbildung 19 zeigt auf, bei wie vielen Streckenabschnitten welche Beeinträchtigung vorlag. Bei den Stellen ID_002_BS (Birs Birskopf), ID_014_LU (Reuss in Luzern) sowie ID_065_ZH (Sihl bei Hütten) wurde die Beprobung als «sehr eingeschränkt» eingestuft. Bei diesen Stellen konnten infolge grosser Tiefe und schneller Strömung nur Teile beprobt werden. Die detaillierten Informationen betreffend Zugang, Watbarkeit und Sicherheitsvorkehrungen sind im **Anhang E** dokumentiert.




Abbildung 19: Anzahl der Probenahmestellen, bei welchen die Beprobung durch einen der dargestellten Faktoren beeinflusst war.







3.7. Witterungsverhältnisse

Der Sommer 2015 ist nach 2003 der zweitwärmste in der 152-jährigen Messgeschichte der Schweiz. Auf der Alpen-Nordseite lagen die Temperaturen bis zu 2.5 Grad über der Norm von 1981 bis 2010.

Niederschlagsmengen und deren Auswirkungen auf die Makrophyten

Nach einem durch Hochwasser geprägten Mai, gingen die Niederschlagsmengen ab Juni zurück und betrugen im Mittelland ab Juni bis September zwischen 30 und 80 % vom langjährigen Mittel (1981 – 2010). In Teilen des östlichen Mittellandes betrug die Niederschlagsmenge im August und September teilweise weniger als 40 Prozent vom langjährigen Mittel. Die **Abbildung 20** zeigt die Abweichung der Niederschlagsmengen im August 2015. Es ist zu erkennen, das in weiten Teilen des Mittellandes und der Voralpen nur 40 – 80 % der Regenmenge des lang-jährigen Mittels (1981 – 2010) angefallen sind.




Abbildung 20: Abweichung der Niederschlagsmengen im August 2015 vom langjährigen Mittel 1981 - 2010.

Dies führte dazu, dass die Abflussmengen und Pegel in den Fliessgewässern im Anschluss an die hohen Abflüssen vom Mai kontinuierlich zurück gingen.








Abbildung 21: Monatsmittel der Abflussmengen von 2015 und deren Abweichung von den langjährigen Mitteln am Beispiel von vier verschiedenen Fliessgewässern.

Die Abbildung 21 zeigt beispielhaft die Abflussverhältnisse und deren Abweichung vom langjährigen Mittel der Birs in Münchenstein, der Lorze in Frauental, der Töss in Neftenbach und der Engelbergeraa in Buochs des Jahres 2015. In den Monaten Januar, März und April lagen die Abflussmengen an allen vier Gewässern bis zu 50 % über dem langjährigen Mittel. Im Mai sind die Abflussmengen aufgrund der grossen Regenmengen bis auf über 100 % von den langjährigen Mitteln abgewichen. In der zweiten Jahreshälfte änderte sich das Bild. Die Abflussmengen gingen infolge der Niederschlagsarmut kontinuierlich zurück. Die Abweichungen von den langjährigen Mitteln betrugen teilweise über - 70 % (Birs, Oktober). Dies bedeutet, dass die Abflussmenge nur noch 30 % des langjährigen Mittels be-tragen hatte. Diese dynamischen Verhältnisse können einen Einfluss auf die Makrophytengemeinschaft an einem Fliessgewässer haben. Hohe Abflussmengen (Mai 2015) können, je nach Fliessgewässer (Einzugsgebiettyp und -grösse, etc), zu Geschiebetrieb führen. Im Mai ist die Entwicklung der Pflanzen in vollem Gange. Durch den Geschiebetrieb werden die Makrophyten in ihrer Entwicklung zurück-geworfen oder, im schlimmsten Fall, ganz zerstört. Zusammen mit den darauf folgenden trockenen Perioden können solche Jahre einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Makrophytengemeinschaft an einem Fliessgewässerabschnitt haben. Die Negativität bezieht sich dabei weniger auf die Anzahl vorkommender Pflanzen als vielmehr auf die Menge an Biomasse, welche nach Störungen gebildet werden kann. Die kontinuierliche Verminderung der Abflussmengen über die Sommermonate hinweg könnte dazu geführt haben, dass Teile des Abflussprofiles eines Fliessgewässerabschnittes trocken fallen und an diesen Stellen wurzelnde Pflanzen infolge des Wassermangels absterben.





4. Diskussion

4.1. Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase stand das Organisieren der beiden Workshops in Zürich und Yverdon-les-Bains im Vordergrund. Am Workshop in Zürich nahmen die Auftraggeber, Auftragnehmer, Vertreter aus den Kantonen Appenzell Innerhoden, Thurgau, Solothurn und Zürich sowie weitere Fachleute teil. Es fand ein reger Austausch zwischen den Beteiligten statt. Bei beiden Workshops wurden verschiedene Fliessgewässer angeschaut und Feldaufnahmen der Vegetation durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass ein fachlicher Austausch zwischen den Beteiligten sehr wichtig ist. In Yverdon-les-Bains nahm der Auftragnehmer der Kantone Waadt und Neuenburg am Workshop teil.

4.2. Feldarbeit

Von Juni bis September 2015 fanden die Feldaufnahmen statt. Das vorgegebene Zeitfenster wurde eingehalten. Sämtliche Felddaten wurden im Anschluss an die Feldarbeit beim Auftragnehmer konsolidiert, auf deren Konsistenz überprüft. Datenlücken und/oder Unklarheiten wurden direkt mit den Personen geklärt, welche die Feldfaufnahmen durchgeführt haben.

Stellenverschiebungen

Die drei Stellenverschiebungen wurden schon im Zwischenbericht zwei dokumentiert. Bei den Abschnitten ID_093_LU (Kleine Emme) und ID_134_BE (Birs) handelt es sich um temporäre Verschiebungen, welche infolge von Bautätigkeiten gemacht wurden. Vor der nächsten Kampagne muss überprüft werden, ob die ursprünglichen Stellen wieder zugänglich respektive wiederhergestellt sind.

Die Stelle ID_060_BE (Sense in Thörishaus) wurde im Jahre 2012 unterhalb und 2015 oberhalb der vorgegebenen Koordinaten erhoben. Gemäss Vorgaben vom Auftraggeber markieren die Koordination das untere Ende eines zu beprobenden Fliessgewässerabschnittes. Die Stelle ID_060_BE soll in Zukunft gleich beprobt werden wie in der Kampagne 2015.

4.3. Bewertung der Vegetationsgemeinschaft nach der Zürcher Methode

36 Stellen (44 %) konnten mit der Zürcher Methode nicht bewertet werden und wurden aufgrund der abiotischen Parametern wie Gefälle, Abflussmenge, mittlere Tiefe, Beschattung und Substratgrösse bei der Typisierung oder der Plausibilisierung den «vegetationsarmen Bächen» zugeteilt. Das sind 12 Stellen mehr als bei den Aufnahmen 2012. Vier Moosbäche wurden aufgrund des hohen Anteils der Moose auf künstlichem Substrat und sehr wenigem Anteil von anderen Wuchsformen (absolute Deckung ≤ 1 %) den vegetationsarmen Bächen zugewiesen. Von den durch die Methode den vegetationsarmen Bächen zugeordneten Abschnitten wurden 30 in diesem Typ belassen, da bei diesen die Moose die dominierende Wuchsform bilden, jedoch in hohen Anteilen auf künstlichem Substrat vorkommen. Ob es sich beim Substrat um künstliches oder um natürliches handelt ist nicht immer leicht einzuschätzen. Bei sichtbaren Verbauungen (zum Beispiel Betonmauer, vermörtelte Natursteinmauer, etc.) ist dies einfacher festzustellen als







bei grossen Blöcken oder Steinen, welche im Gewässer stehen. Diese können, je nach Einzugsgebiet und Abflussmenge, als Sohlen- oder Ufersicherungen eingebracht worden sein, oder durch Geschiebetrieb an den Standort transportiert worden sein. Als Beispiel kann die Simme (ID_133_BE) herangezogen werden. In Ufernähe stehen beidseits grosse Blöcke im Gerinne. Ob es sich dabei um Reste der Uferverbauung handelt oder ob diese mit dem Geschiebe herantransportiert wurden, ist nicht klar zu entscheiden, da keine Strukturen von menschlichen Eingriffen zu erkennen sind.

4.4. Vergleich der Aufnahmen 2012 und 2015

In der **Tabelle 6** sind die Bewertungen der Jahre 2012 und 2015 zusammenfassend dargestellt. Pro Bachtyp, Bewertungsklasse und Jahr sind die Anzahl Fliessgewässerabschnitte eingetragen. Die Vergleiche auf Stellenebene sind im **Anhang C** aufgelistet.

Tabelle 6: Vergleichende Auflistung der Bewertungen der Jahre 2012 und 2015 [11].

	Bewertu	ung (Anz	zahl Stell	en pro Bac	htyp und	l Bewerti	ungsklasse)				
	Keine Bew	vertung	«seh	r gut»	«gı	ıt»	«mäs	sig»	«schle	echt»	To	tal
Bachtyp	2012	2015	2012	2015	2012	2015	2012	2015	2012	2015	2012	2015
Helophytenbach			1	4	6	5	2		1		10	9
Moosbach			8	2	16	9	1	4	5	3	30	18
Submersenbach					5	4	7	7	6	7	18	18
Vegarm Bach	24	36									24	36
Total	24	36	9	6	27	18	10	11	12	10	82	81
Differenz 2012 zu 2015		+12		-3		-9		+1		-2		

Die grossen Differenzen zwischen den Aufnahmen sind, wie oben beschrieben, bei den vegetationsarmen Bächen zu finden. 12 Abschnitte wurden bei der Plausibilisierung der Ergebnisse den vegetationsarmen Bächen zugeordnet. Der Grossteil wurde beim Plausibilisierungsprozess von den Moosbächen den vegetationsarmen Bächen zugewiesen, weil der Bewuchs in hohem Grade (bis zu 100%) auf künstlichem Substrat wächst. Andere Wuchsformen kommen bei diesen Abschnitten, wenn überhaupt, nur in sehr kleinen Anteilen vor. Ansonsten gibt es zwischen den Aufnahmen der beiden Perioden keine grossen Abweichungen der Anzahl Stellen pro Bachtyp und Bewertungsklasse.

Häufige Taxa

In der **Tabelle 7** sind die Taxa (Gefässpflanzen und Moose) aufgelistet, welche in den Jahren 2012 und 2015 an mehr als 5 Stellen vorgekommen sind.

Tabelle 7: Liste der Gefässpflanzen und Mosse, welche 2012 oder 2015 an mehr als 5 Stellen aufgenomen wurden.

Gefässpflanzen		2012	2015
Phalaris arundinacea	Rohr-Glanzgras	33	38
Agrostis stolonifera	Kriechendes Straussgras	30	33
Deschampsia caespitosa	Rasen-Schmiele	15	21
Nasturtium officinale	Echte Brunnenkresse	15	12
Glycera sp./notata/fluitans	Süssgras	14	13
Veronica beccabunga	Bachbungen-Ehrenpreis	11	10
Myriophyllum spicatum	Ähriges Tausendblatt	9	8
Equisetum arvense	Acker-Schachtelhalm	8	9







C	I		
Salix purpurea	Purpur-Weide	8	5
Impatiens glandulifera	Drüsiges Springkraut	7	
Rubus sp.	Brommbeere	7	
Solanum dulcamara	Bittersüsser Nachtschatten	7	
Epilobium hirsutum	Zottiges Weidenröschen	6	5
Potamogeton pectinatus	Kammförmiges Laichkraut	6	5
Phragmites australis	Schilf	5	9
Veronica anagallis-aquatica	Blauer Wasser-Ehrenpreis	5	6
Festuca gigantea	Riesen-Schwingel	5	
Impatiens parviflora	Kleines Springkraut	5	
Iris pseuodacorus	Gelbe Schwertlilie	5	
Poa annua	Einjähriges Rispengras	5	
Equisetum palustre	Sumpf-Schachtelhalm		8
Callitriche sp.	Wasserstern		5
Carex sp.	Seggen		5
Rorippa palustris	Echte Sumpfkresse		5
Scirpus sylvaticus	Waldbinse		5
Mooso		2012	2015
Moose		2012	2015
	Gamainas Brunnanmaas		
Fontinalis antipyretica	Gemeines Brunnenmoos	51	49
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides	Mäusedornmoos	51 34	49 48
Fontinalis antipyretica		51	49
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahn- moos Ufermoos	51 34	49 48
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahn- moos	51 34 31	49 48 28
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahn- moos Ufermoos	51 34 31 28	49 48 28
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlaf-	51 34 31 28 23	49 48 28 18 37
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes Cratoneuron filicium Hygrohypnum luridum	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlafmoos	51 34 31 28 23 18	49 48 28 18 37 17
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes Cratoneuron filicium Hygrohypnum luridum Brachythecium rivulare	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlafmoos Bach-Kurzbüchsenmoos	51 34 31 28 23 18 10	49 48 28 18 37 17 14
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes Cratoneuron filicium Hygrohypnum luridum Brachythecium rivulare Cinclidotus danubicus	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlafmoos Bach-Kurzbüchsenmoos Donau-Gitterzahnmoos	51 34 31 28 23 18 10 8	49 48 28 18 37 17 14
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes Cratoneuron filicium Hygrohypnum luridum Brachythecium rivulare Cinclidotus danubicus Cinclidotus fontinaloides	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlafmoos Bach-Kurzbüchsenmoos Donau-Gitterzahnmoos Grosses Gitterzahnmoos	51 34 31 28 23 18 10 8 6 5	18 28 18 37 17 14
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes Cratoneuron filicium Hygrohypnum luridum Brachythecium rivulare Cinclidotus danubicus Cinclidotus fontinaloides Amblystegium tenax	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlafmoos Bach-Kurzbüchsenmoos Donau-Gitterzahnmoos Grosses Gitterzahnmoos Starrer Stumpfdeckel	51 34 31 28 23 18 10 8 6 5	49 48 28 18 37 17 14 7 15 8
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes Cratoneuron filicium Hygrohypnum luridum Brachythecium rivulare Cinclidotus danubicus Cinclidotus fontinaloides Amblystegium tenax Pellia endivifolia	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlafmoos Bach-Kurzbüchsenmoos Donau-Gitterzahnmoos Grosses Gitterzahnmoos Starrer Stumpfdeckel Kelch-Beckenmoos	51 34 31 28 23 18 10 8 6 5 4	49 48 28 18 37 17 14 7 15 8 7
Fontinalis antipyretica Rhynchostegium riparioides Cinclidotus riparius Amblystegium riparium Fissidens crassipes Cratoneuron filicium Hygrohypnum luridum Brachythecium rivulare Cinclidotus danubicus Cinclidotus fontinaloides Amblystegium tenax	Mäusedornmoos Zungenblättriges Gitterzahnmoos Ufermoos Dickstieliges Spaltzahnmoos Farnähnlichs Starknervmoos Bräunliches Wasserschlafmoos Bach-Kurzbüchsenmoos Donau-Gitterzahnmoos Grosses Gitterzahnmoos Starrer Stumpfdeckel	51 34 31 28 23 18 10 8 6 5	49 48 28 18 37 17 14 7 15 8

In der **Tabelle 8** sind die häufigsten Taxa (**Tabelle 7**) gegen die Messstellen aufgetragen. Grün hinterlegte Felder bedeuten, dass eine Art an der jeweiligen Messstelle (ID) aufgenommen wurde.

Tabelle 8: Die Häufigsten Taxa aufgetragen gegen die Messstellen (ID).

		Gefässpflanzen M														Moose																
	Taxa an Anzahl Stellen	38 Phalaris arundinacea	зз Agrostis stolonifera	21 Deschampsia caespitosa	13 Glycera sp./notata/fluitans	12 Nasturtium officinale	10 Veronica beccabunga	9 Equisetum arvense	9 Phragmites australis	8 Equisetum palustre	8 Myriophyllum spicatum	6 Veronica anagallis-aquatica	5 Callitriche sp.	5 Carex sp.	5 Epilobium hirsutum	5 Potamogeton pectinatus	5 Rorippa palustris	5 Salix purpurea	5 Scirpus sylvaticus	49 Fontinalis antipyretica	48 Rhynchostegium riparioides	37 Fissidens crassipes	28 Cinclidotus riparius	18 Amblystegium riparium	17 Cratoneuron filicinum	15 Cinclidotus fontinaloides	14 Hygrohypnum luridum	8 Amblystegium tenax	7 Cinclidotus danubicus	7 Pellia endiviifolia	5 Amblystegium fluviatile	5 Marchantia polymorpha
ID																																Ш
ID																																
062 063																																H
065 066 067 068 069 070 071 072																																
073 074 075																																

Tabelle 8: Fortsetzung

		Ge	Gefässpflanzen M														Moose															
j		 													_																	
	Taxa an Anzahl Stellen	38 Phalaris arundinacea	зз Agrostis stolonifera	21 Deschampsia caespitosa	13 Glycera sp./notata/fluitans	12 Nasturtium officinale	10 Veronica beccabunga	9 Equisetum arvense	9 Phragmites australis	8 Equisetum palustre	8 Myriophyllum spicatum	6 Veronica anagallis-aquatica	5 Callitriche sp.	5 Carex sp.	5 Epilobium hirsutum	5 Potamogeton pectinatus	5 Rorippa palustris	s Salix purpurea	5 Scirpus sylvaticus	49 Fontinalis antipyretica	48 Rhynchostegium riparioides	37 Fissidens crassipes	28 Cinclidotus riparius	18 Amblystegium riparium	17 Cratoneuron filicinum	15 Cinclidotus fontinaloides	14 Hygrohypnum luridum	8 Amblystegium tenax	7 Cinclidotus danubicus	7 Pellia endiviifolia	5 Amblystegium fluviatile	5 Marchantia polymorpha
		m	m	2	1	_	_													4	4	m	2	1	1	1	_				<u> </u>	
1D 076 079 084 085 087 088 089 092 093 094 095 098 100 106 107 111 114 115 116 119 123 126 127 128 129 130 131 132 133																																
134																																





4.5. Bewertung der Ökomorphologie Stufe F

In der **Abbildung 22** sind Resultate der ökomorphologischen Bewertung der Jahre 2012 und 2015 aufgetragen. Die Balken zeigen pro Jahr die prozentualen Anteile pro Bewertungsklasse der Fliessgewässerabschnitte.




Abbildung 22: Vergleichende Darstellung der Bewertungsklassen der Ökomorphologie der Jahre 2012 und 2015.

Es zeigt sich, dass es keine grossen Unterschiede in den Bewertungen gibt. Es gibt keine Abschnitte mehr, welche als «künstlich/naturfremd» bewertet wurden. Es handelt sich hierbei um die Abschnitte ID-009-SO (Limpach), ID-022-VD (Broye), ID-042-ZH (Sihl) und ID-046-ZH (Aa). Bei diesen Abschnitten wurde bei den Aufnahmen 2015 die Uferbereichsbreite grösser eingeschätzt als im Jahre 2012 und bei ID-009-SO (Limpach) wurde zudem der Verbauungsgrad der Sohle kleiner eingeschätzt. Die Aufnahmen wurden bei diesen Stellen (ausser bei ID-022-VD) in beiden Perioden durch die gleichen Personen durchgeführt. Dies zeigt auf, dass die abiotischen Verhältnisse nicht einfach zu erfassen sind und die Einschätzungen von den gleichen Personen im Abstand von einigen Jahren anders wahrgenommen werden können.

Anlässlich der Workshops im Vorfeld der Feldaufnahmen wurde die Erhebung der ökomorphologischen Parameter diskutiert und harmonisiert. Die Erkenntnisse aus diesen Diskussionen können ebenfalls zu einer abweichenden Einschätzung der Verhältnisse an den oben genannten Fliessgewässerabschnitten geführt haben.

5. Empfehlungen

5.1. Vorbereitungsphase

Es wäre sinnvoll wenn zukünftig nur ein Workshop durchgeführt würde, so dass alle am Projektbeteiligten an einem Tag zusammen kommen und sich austauschen können. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass Sprachbarrieren überwunden werden können und die Anreise für alle Beteiligten in etwa gleich lang sind.

5.2. Feldarbeit

Stellenverschiebung

Beim Abschnitt ID_056_BE (Engstlige) sollte eine definitive Verschiebung der Stelle in Betracht gezogen werden. An der vorgegebenen Stelle befindet sich ein Kieswerk. Bis anhin konnte das linke Gerinne beprobt werden. Im Jahre 2015 wurde die Abbaufläche verschoben. Aus diesem Grund wurde die Stelle rund 350 Meter flussaufwärts verlegt. In der **Abbildung 23** ist die Kiessabbau-Nutzfläche und der beprobte Gewässerabschnitt dargestellt.



Abbildung 23: Kiesabbaugebiet bei der Stelle ID_056_BE, Engstlige in Frutigen. (Quelle: Geoportal des Kantons Bern, 21.12.2016)



Kiessabbaugebiet gemäss Geoportal Kanton Bern.



Fliessrichtung



Blaue Fläche: Beprobter Gewässerabschnitt



Standort der Probenahmestelle gemäss Vorgaben Auftraggeber.



Standort der Probnahmestelle 2015. Die Stelle wurde rund 350 Meter flussaufwärts verschoben.







6. Fazit

Projektverlauf

In der Vorbereitungsphase standen vor Allem die beiden Workshops in der Deutsch- und Westschweiz im Fokus. Beide konnten problemlos durchgeführt werden. In der Westschweiz nahm eine Person am Workshop teil. Diese führte die Aufnahmen für die Kantone Neuenburg und Waadt durch. In Zürich war die Teilnehmerzahl grösser und es fanden Fachleute, Kantonsvertreter und Auftragsnehmer zusammen. Eine erneute Zusammenlegung der beiden Workshops wäre sinnvoll, denn nur so kommen alle beteiligten Parteien zusammen, lernen sich kennen und können sich untereinander austauschen. Dies auch vor dem Hinter-grund, dass bald eine schweizweite Methode des Modul-Stufen-Konzeptes für Makrophyten herauskommen wird. Der Workshop soll für zukünftige Aufnahmen als Vorbereitung für die Feldarbeit bestehen bleiben, damit die Harmonisierung der Aufnahmen weiterhin gewährleistet ist und/oder weiter vertieft werden kann. Die Feldarbeiten und sind ohne Probleme über die Bühne gegangen. Einzelne Stellen mussten aufgrund von Baustellen flussaufwärts verschoben werden. Dies wurde im Zwischenbericht des Meilensteins 2 sowie in diesem Bericht dokumentiert. Das Zusammenführen und digitalisieren der Felddaten mit den Erhebungen der Kantone NE, VD und ZH hat funktioniert. Zudem wurden die Daten in eine Excel Datei übertragen und für den Schlussbericht aufbereitet.

Floristische Hinweise

Die Makrophyten sind Teil des Lebensraumes Fliessgewässer. Sie nutzen diesen Lebensraum ihrerseits für die eigene Ausbreitung und bieten mit ihren Strukturen Lebensraum für andere Lebewesen, wie Wirbellose und Fische. Zudem strukturieren die Makrophyten ein Fliessgewässer mit ihrem (arttypischen) Wuchsverhalten. Dies hat Auswirkungen auf das Fliessverhalten des Wasserkörpers hin-sichtlich Fliessgeschwindigkeit, Lichtverhältnisse, etc. Mit den Erhebung der Makrophyten in den Fliessgewässern werden wichtige biologische Informationen erhoben. Die Ausbreitung der aquatischen Arten in den Fliessgewässern kann mit den NAWA Erhebungen schweizweit dokumentiert werden. Bei den NAWA Auf-nahmen 2015 wurden insgesamt 191 Taxa aufgenommen (135 Gefässpflanzen und 53 Moostaxa). Die am meisten aufgenommenen Taxa (Top 5) sind bei den Gefässpflanzen wie auch bei den Moosen praktisch identisch mit den Aufnahmen von 2012. Neu wird beim Festhalten der Taxa im Feld die Sicherheit der Bestimmung erfasst. Das heisst, die Probenehmende Person hält auf dem Feldprotokoll fest, wie sicher eine Bestimmung eines Taxons ist. Hinweise auf die Sicherheit einer Bestimmung sind geforderte Pflanzenbestandteile/ -Merkmale, wie zum Beispiel Blütenstände und Früchte oder die (Zweit-) Bestimmung durch einen Fachexperten. In diesem Projekt wurden sämtliche Moose durch Fachexperten (FUB AG) bestimmt. Ebenso die Armleuchteralgen (AquaPlus). Seit der Einführung des neuen Feldprotokolles werden auch terrestrische Neophyten erhoben, welche im unmittelbaren Uferbereich der Fliessgewässerabschnitte wachsen. Es sind acht invasive Neophyten in den Uferbereichen von 26 Abschnitten erfasst.

Wie weiter

Die Makrophytenerhebungen an den NAWA Stellen sind ein weiteres Teil im Puzzle der biologischen Indikatoren. Es ist wichtig, dass dies Aufnahmen weiter-geführt werden. Nur so können Veränderungen langfristig dokumentiert werden. In naher Zukunft wird das Modul-Stufen-Konzept mit einer Methode für die Makrophyten erweitert. Die Aufnahmen dieser Periode und die vorangegangenen werden mit den künftigen vergleichbar sein, da die Aufnahmemethodik (Feldprotokoll) nur leicht verändert werden wird.







7. Literaturverzeichnis

- [1] BAFU (2013): NAWA Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität. Konzept Fliessgewässer. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 1327: 72 Seiten sowie Anhang mit den Messstellenblättern.
- [2] BAFU (2014): Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität NA-WA-TREND Biologie. Pflichtenheft Teil B: Für das WTO-Projekt (1495) 810 mit Publikation vom 28. Mai 2014 auf SIMAP, Bundesamt für Umwelt, Bern. 42 Seiten
- [3] BAFU (2016): Zustand der Schweizer Fliessgewässer. Ergebnisse der Nationalen Beobachtung Oberflächengewässerqualität (NAWA) 2011–2014. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Zustand Nr. 1620: 87 Seiten.
- [4] Känel, B., Göggel, W., Weber, C. und Meier, W. (2010): Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer Vegetation im Kanton Zürich. Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich, Abteilung Gewässerschutz. 102 S. http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/wasserwirtschaft/gewaessergualitaet/fg_methoden.html (Zürcher Methode)
- **BUWAL (1998):** Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer in der Schweiz. Ökomorphologie Stufe F (flächendeckend). Mitteilungen zum Gewässerschutz Nr. 27. Bern. http://www.modul_stufen_konzept.ch/fg/module/oekomor_f/index.
- [6] Bornand C., Gygax A., Juillerat P., Jutzi M., Möhl A., Rometsch S., Sager L., Santiago H., Eggenberg S. (2016): Rote Liste Gefässpflanzen. Gefährdete Arten der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern und Info Flora, Genf. Umwelt-Vollzug Nr. 1621: 178 S.
- [7] SCHNYDER, N., BERGAMINI, A., HOFMANN, H., MÜLLER, N., SCHUBI-GER-BOSSARD, C. & URMI, E. (2004): Rote Liste der gefährdeten Moose der Schweiz. Hrsg. BUWAL, FUB & NISM. BUWAL-Reihe: Vollzug Umwelt. 99 S.
- [8] Neophyten CH (2014): Schwarze Liste und Watch-List (Stand August 2014), https://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infobl%C3%A4tter.html
- [9] **Hydrodaten (2016):** http://hydrodaten.admin.ch/de/tabelle-der-aktuellen-situation-der-abflusse-und-wasserstande.html
- [10] Infoflora (2017): Infoblatt der invasiven Neopyhten: Bedrohung für Natur, Gesundheit und Wirtschaft.
 https://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophyten/inva_elod_n ut d.pdf.
- [11] Roth E. (2013a): NAWA TREND Biologie 2011 2013, Teil Makrophyten. Expertenbericht im Auftrag des BAFU
- [12] Meteoschweiz (2015):
 http://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/gegenwart/monats-und-jahreskarten.html?filters=precip_anom_2015_01_2015







8. Glossar

 ${\bf Tabelle~9:~Glossar,~Definition~der~wichtigsten~Begriffe~im~Zusammenhang~mit~Makrophyten.}$

Abiotische Parameter	Parameter, welche den nicht lebenden Teil eines Öko-
Abiotische Parameter	
	systems beschreiben (z.B.: Beschattung, Substrat, Ge-
	fälle)
Absolute Deckung einer Art	Realer Anteil einer Untersuchungstrecke, der durch
	eine Art bedeckt ist.
Helopyhten	Makrophyten, welche nur mit ihren basalen Teilen
	(Wurzeln) dauerhaft unter Wasser stehen
invasive Neophyten	Invasive nicht einheimische Pflanzen, die aus fremden
	Gebieten (meist aus anderen Kontinenten) stammen
	und sich bei uns in der Natur auf Kosten einheimischer
	Arten stark und rasch ausbreiten.
Makrophyten	Von blossem Auge erkennbare Wasserpflanzen. (Ge-
Makrophyten	fässpflanzen, Moose und makroskopische Algen)
Rote Liste der Gefässpflan-	Liste der gefährdeten Arten der Schweiz
	Liste der geranfdeten Arten der Schweiz
zen	Library dentity of the Managhan Color
Schwarze Liste Gefässpflan-	Liste der invasiven Neophyten bei denen aufgrund des
zen	aktuellen Kenntnisstands ein hohes Ausbreitungspo -
	tenzial in der Schweiz gegeben oder zu erwarten ist.
	Zudem ist der Schaden in den Bereichen Biodiversität,
	Gesundheit und/oder Ökonomie erwiesen und hoch .
Schwimmblattpflanzen	Im Sediment wurzelnde Wasserpflanzen, die auf der
	Wasseroberfläche Schwimmblätter ausbilden. Unter-
	wasserblätter können vorhanden sein.
Submerse Makrophyten	Wasserpflanzen, deren ganze Sprossachse dauerhaft
	untergetaucht ist.
Vegetationsgemeinschaft	Gesamtheit der an einem Standort wachstenden Pflan-
	zen.
Watch-List	Liste der invasiven Neophyten bei denen ausgehend
	vom heutigen Kenntnisstand ein mittleres bis hohes
	Ausbreitungspotenzial in der Schweiz gegeben oder
	zu erwarten ist. Zudem ist der Schaden in den Berei-
	chen Biodiversität, Gesundheit und/oder Ökonomie
	mittel bis hoch . Vorkommen und Ausbreitung dieser
	Arten muss zumindest beobachtet werden, und es
	müssen weitere Kenntnisse zu diesen Arten gesammelt
	werden. Liste der invasiven Neophyten bei denen aus-
	gehend vom heutigen Kenntnisstand ein mittleres bis
	hohes Ausbreitungspotenzial in der Schweiz gege-
	ben oder zu erwarten ist. Zudem ist der Schaden in
	den Bereichen Biodiversität, Gesundheit und/oder
	Ökonomie mittel bis hoch . Vorkommen und Ausbrei-
	tung dieser Arten muss zumindest beobachtet werden,
	und es müssen weitere Kenntnisse zu diesen Arten
	gesammelt werden.
Wuchsform	Morphologische Ausgestaltung / Gesamtheit aller
	Merkmale einer Pflanze



Anhang:

- A Liste der Probenahmestellen
- B Liste der Auswertungen (Resultate_Mastertabelle)
- C Bewertungen aus den Jahren 2012 und 2015
- D Taxaliste mit Angabe der Fundhäufigkeit
- **E Stelleninformationen**
- F Feldprotokolle und Fotos aller Stellen





Anhang A

Liste der Probenahmestellen

ID	Gewässer	Stelle	Kt.	MüM	Koord. X	Koord. Y
CH_002_BS	Birs	Briskopf	BS	250	613′496	267'409
CH_007_BE	Emme	Gerlafingen	BE	445	609'497	225′485
CH_009_SO	Limpach	Kyburg	SO	461	605′960	220'819
CH_011_SO	Lüssel	Breitenbach	SO	685	607′744	250′786
CH_012_OW	Sarneraa	Kägiswil	OW	460	662′600	195′770
CH_014_LU	Reuss	Luzern	LU	429	664′302	212′925
CH_020_VD	Venoge	Les Bois	VD	383	532′019	154′067
CH_021_VD	Thièle	Yverdon	VD	432	538′470	180′925
CH_022_VD	Broye	Domdidier	VD	430	566′193	191′957
CH_023_SG	Steinach	Mattenhof	SG	410	750′755	262'628
CH_025_SG	Sitter	Leerbrugg	SG	540	745′537	258′250
CH_026_SG	Thur	Niederbüren	SG	480	732′383	259′206
CH_027_SG	Necker	Lütisburg	SG	560	724′298	250'473
CH_028_SG	Glatt	Niederuzwil	SG	495	729′400	256′250
CH_032_AG	Pfaffnern	Rothrist	AG	401	634'425	239′720
CH_033_AG	Wyna	Suhr	AG	395	649'064	246′872
CH_034_AG	Bünz	Möriken	AG	373	656′431	251′255
CH_035_AG	Surb	Döttingen	AG	334	662′285	268′508
CH_036_AG	Sissle	Eiken	AG	311	641′430	265′551
CH_039_AG	Suhre	Suhr	AG	388	648′700	247′570
CH_040_ZH	Limmat	Hönggersteg	ZH	397	678′995	250'451
CH_041_ZH	Töss	Freienstein	ZH	355	685′975	265′000
CH_042_ZH	Sihl	Sihlhölzli	ZH	410	682′151	246′870
CH_043_ZH	Glatt	Rheinsfelden	ZH	335	678′084	269'666
CH_044_ZH	Glatt	Abfluss Greifensee	ZH	435	691′137	248′360
CH_045_ZH	Aabach	Mönchaltdorf	ZH	438	696′918	240'818
CH_046_ZH	Aa	Niederuster	ZH	443	694′942	244′954
CH_047_ZH	Reppisch	Dietikon	ZH	384	672′447	251′570
CH_048_ZH	Jona	Nach Rüti	ZH	430	707′181	233′752
CH_049_ZH	Furtbach	Otelfingen	ZH	415	671′475	255′831
CH_050_ZH	Thur	Andelfingen	ZH	254	692′986	273′000
CH_054_FR	Sionge	Vuippens	FR	677	572′350	167′640
CH_056_BE	Engstlige	Fruttigen	BE	815	615′079	158′397
CH_058_BE	Chise	Oberdiessbach	BE	616	613′800	188′940
CH_059_BE	Gürbe	Mündung Aare	BE	511	603′555	196′625
CH_060_BE	Sense	Thörishaus	BE	552	593'480	192′912
CH_062_BE	Urtenen	Schalunen	BE	481	606′963	217′386
CH_063_BE	Langete	Mangen	BE	435	628'600	232′897
CH_065_ZH	Sihl	Hütten	ZH	684	693′193	225′357
CH_066_ZH	Töss	Rämismühle	ZH	521	703′631	255′743
CH_067_BL	Ergolz	Augst	BL	263	620′950	264′930
CH_068_JU	Sorne	Delémont	JU	410	593′577	246′286
CH_069_JU	Scheulte	Vicques	JU	464	599'485	244′150
CH_070_TG	Murg	Frauenfeld	TG	390	709′510	269′793

CH_071_TG	Lauche	Matzingen	TG	440	712′330	264′343
CH_072_TG	Chemmenbach	Märstetten	TG	420	721′604	273′121
CH_073_TG	Salmsacher Aach	Salmsach	TG	410	744′157	268′389
CH_074_NW	Engelbergeraa	Oberdorf	NW	455	672′181	201′740
CH_075_ZG	Lorze	Frauenthal	ZG	389	674′523	230′480
CH_076_ZG	Lorze	Letzi, Zug	ZG	416	680′602	226′099
CH_079_AG	Aabach	Niederlenz	AG	361	655′102	251′262
CH_084_JU	Allaine	Boncourt	JU	365	567′900	261′300
CH_085_NE	Areuse	Boudry	NE	445	554′430	199′950
CH_087_JU	Birs	Les Riedes_Dessus	JU	384	597′675	249′340
CH_088_JU	Doubs	Ocourt	JU	416	571′760	243′715
CH_089_SO	Dünnern	Olten	SO	402	634′035	244'042
CH_092_BE	Kander	Hondrich	BE	620	616′905	170′230
CH_093_LU	Kleine Emme	Littau_Reussbühl	LU	449	662'051	212′318
CH_094_BE	La Suze	Biel	BE	429	584′757	220′288
CH_095_GR	Landquart	Felsenbach	GR	570	765′245	204'813
CH_098_TI	Maggia	Locarno, Solduno	TI	200	703′084	113′851
CH_099_TI	Moesa	Lumino	TI	240	724′346	120′161
CH_100_SZ	Muota	Wilerbrugg, Ingenbohl	SZ	434	688'626	206′170
CH_106_BE	Saane	Marfeldingen	BE	463	585′905	203'017
CH_107_FR	Sarine	Broc	FR	678	573′606	161′929
CH_111_AG	Wigger	Zofingen	AG	420	637′194	238′503
CH_114_BE	Emme	Emmenmatt	BE	640	623′712	199′785
CH_115_AI	Sitter	Appenzell	Al	790	750′019	243′282
CH_116_LU	Ron	Hochdorf	LU	464	663′856	224'870
CH_119_NE	Seyon	Valangin	NE	635	559′534	207′117
CH_123_TI	Maggia	Brontallo	TI	608	692′818	134′910
CH_126_VD	Mentue	Mauguettaz	VD	446	545′382	180′961
CH_127_VD	Talent	Chavornay	VD	440	532′670	173′050
CH_128_VD	Promenthouse	Le Rancho	VD	390	510′106	140′064
CH_129_VD	Boiron de Morges	Lac	VD	375	526′258	149'616
CH_130_VD	Aubonne	Allaman	VD	390	520′733	147′424
CH_131_VD	Veveyse	Vevey	VD	379	553′755	145′725
CH_132_VD	Grande Eau	Amont Rhône	VD	394	561′082	130′553
CH_133_BE	Simme	Latterbach	BE	640	612′505	168′441
CH_134_BE	La Birse	Choindez	BE	477	596′376	240′149
CH_135_AR	Urnäsch	Kubel	AR	590	742′503	251′590

Anhang B

Liste der Auswertungen (Resultate Mastertabelle)

ID	Beprobt durch	am	Typisierung Methode_ZH	Ökomorpho- logie	Gesamtde- ckung	Standortgerechtigkeit	Bewertung Vielfalt	Gesamtbewer- tung 1: sehr gut
					(%)	1: nicht standorttypisch 2: Übergangsform 3 standorttypisch 0: keine Bewertung	1: artenarm 2: red. Artenvielfalt 3: artenreich 0: keine Bewertung	2: gut 3: mässig 4: schlecht 0: keine Bewertung
CH_002_BS	AquaPlus, Ernst Roth	30.6.15	Submersenbach	3	9	1	1	4
CH_007_BE	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Submersenbach	3	5.3	1	1	4
CH_009_SO	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Helophytenbach	3	46.1	2	3	1
CH_011_SO	AquaPlus, Ernst Roth	30.6.15	Veg. arm. Bach	3	10.1	0	0	0
CH_012_OW	AquaPlus, Ernst Roth/ Joachim Hürlimann	10.9.15	Submersenbach	3	8.01	1	1	4
CH_014_LU	AquaPlus, Ernst Roth/ Joachim Hürlimann VD (Pascal Mulattieri /	10.9.15	Submersenbach	3	11	3	1	3
CH_020_VD	Lionel Sager)	7.8.15	Moosbach	3	20	1	2	3
CH_021_VD	VD (Pascal Mulattieri)	18.7.15	Submersenbach	3	55	1	2	3
CH 022 VD	VD (Pascal Mulattieri / Lionel Sager)	7.8.15	Submersenbach	3	70	1	3	2
CH_023_SG	FUB AG, Nikalus Müller	20.8.15	Veg. arm. Bach	3	1.04	0	0	0
CH_025_SG	FUB AG, Nikalus Müller	20.8.15	Moosbach	1	0.91	1	3	2
CH_025_3G CH_026_SG		21.8.15	Veg. arm. Bach	2	0.27	0	0	0
CH_027_SG	FUB AG, Nikalus Müller FUB AG, Nikalus Müller	21.8.15	Moosbach	1	0.27	2	3	2
CH_028_SG	FUB AG, Nikalus Müller	12.8.15	Veg. arm. Bach	1	0.57	0	0	0
CH_032_AG	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Moosbach	2	1	1	3	2
CH_033_AG	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Moosbach	2	0.5	3	1	3
CH 034 AG	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Helophytenbach	2	8	2	3	1
CH_035_AG	AquaPlus, Ernst Roth	30.6.15	Veg. arm. Bach	3	4	0	0	0
CH_036_AG	AquaPlus, Ernst Roth	30.6.15	Moosbach	2	5	1	3	2
CH_039_AG	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Moosbach	2	3.2	1	3	2
CH 040 ZH	ZH (Barbara Känel)	14.7.15	Submersenbach	2	0.5	1	1	4
CH_041_ZH	ZH (Barbara Känel)	30.6.15	Veg. arm. Bach	3	2	0	0	0
CH_042_ZH	ZH (Barbara Känel)	11.6.15	Veg. arm. Bach	3	8.5	0	0	0
CH 043 ZH	ZH (Barbara Känel)	30.6.15	Submersenbach	3	3	1	1	4
CH_044_ZH	ZH (Barbara Känel)	2.7.15	Submersenbach	3	20	3	1	3
CH_045_ZH	ZH (Barbara Känel)	2.7.15	Submersenbach	3	10	3	1	3
CH 046 ZH	ZH (Barbara Känel)	2.7.15	Veg. arm. Bach	3	1	0	0	0
CH 047 ZH	ZH (Barbara Känel)	25.6.15	Veg. arm. Bach	3	2.5	0	0	0
CH_048_ZH	ZH (Barbara Känel)	2.7.15	Veg. arm. Bach	2	0.5	0	0	0
CH_049_ZH	ZH (Barbara Känel)	30.6.15	Submersenbach	3	80	3	2	2
CH_050_ZH	ZH (Barbara Känel)	30.6.15	Veg. arm. Bach	2	1.25	0	0	0
CH_054_FR	AquaPlus, Ernst Roth	25.8.15	Moosbach	2	3.1	3	3	1
CH_056_BE	AquaPlus, Ernst Roth	29.6.15	Veg. arm. Bach	1	0	0	0	0
CH_058_BE	AquaPlus, Ernst Roth	29.6.15	Moosbach	3	4	1	2	3
CH_059_BE	AquaPlus, Ernst Roth	29.6.15	Submersenbach	2	15	2	2	2
CH_060_BE	AquaPlus, Ernst Roth	25.8.15	Veg. arm. Bach	2	4	0	0	0
CH_062_BE	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Submersenbach	3	90	1	1	4
CH_063_BE	AquaPlus, Ernst Roth	30.6.15	Veg. arm. Bach	3	3.5	0	0	0
CH_065_ZH	ZH (Barbara Känel)	11.6.15	Moosbach	2	3	3	3	1
CH_066_ZH	ZH (Barbara Känel)	30.6.15	Veg. arm. Bach	3	6.25	0	0	0
CH_067_BL	AquaPlus, Ernst Roth	30.6.15	Veg. arm. Bach	2	5	0	0	0
CH_068_JU	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Submersenbach	2	30	1	2	3
CH_069_JU	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Moosbach	3	10.5	1	3	2





	1						Ī	
CH_070_TG	FUB AG, Nikalus Müller	20.8.15	Veg. arm. Bach	3	66.3	0	0	0
CH_071_TG	FUB AG, Nikalus Müller	20.8.15	Helophytenbach	3	11.2	1	3	2
CH_072_TG	FUB AG, Nikalus Müller	20.8.15	Helophytenbach	3	21	2	2	2
CH_073_TG	FUB AG, Nikalus Müller	20.8.15	Veg. arm. Bach	2	3.11	0	0	0
CH 074 NW	AquaPlus, Ernst Roth/ Joachim Hürlimann	10.9.15	Veg. arm. Bach	2	4	0	0	0
CH 075 ZG	AquaPlus, Ernst Roth	11.8.15	Submersenbach	2	4.1	3	1	3
CH 076 ZG	AguaPlus, Ernst Roth	11.8.15	Veg. arm. Bach	3	5	0	0	0
CH 079 AG	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Moosbach	1	9	1	1	4
CH_084_JU	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Helophytenbach	3	86.2	1	3	2
CH 085 NE	NE (Pascal Mulattieri)	19.6.15	Moosbach	3	45	1	3	2
CH 087 JU	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Helophytenbach	3	18.2	2	2	2
CH 088 JU	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Helophytenbach	2	8	2	2	2
CH 089 SO	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Veg. arm. Bach	3	1.1	0	0	0
CH_092_BE	AquaPlus, Ernst Roth	29.6.15	Veg. arm. Bach	2	1	0	0	0
CH 093 LU	AquaPlus, Ernst Roth/ Joachim Hürlimann	10.9.15	Veg. arm. Bach	3	2	0	0	0
CH 094 BE	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Veg. arm. Bach	3	5.3	0	0	0
			- C	2	0.21	0	0	0
CH_095_GR	FUB AG, Nikalus Müller	13.8.15	Veg. arm. Bach	2		0	0	0
CH_098_TI	FUB AG, Nikalus Müller	28.8.15	Veg. arm. Bach	2	0.13			0
CH_099_TI	FUB AG, Nikalus Müller AquaPlus, Ernst Roth/	25.8.15	Moosbach	2	0.34	1	3	2
CH_100_SZ	Joachim Hürlimann	10.9.15	Submersenbach	3	5	1	2	3
CH_106_BE	AquaPlus, Ernst Roth	25.8.15	Submersenbach	3	7.1	1	1	4
CH_107_FR	AquaPlus, Ernst Roth	25.8.15	Veg. arm. Bach	2	0.1	0	0	0
CH_111_AG	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Veg. arm. Bach	3	1.01	0	0	0
CH_114_BE	AquaPlus, Ernst Roth	29.8.15	Veg. arm. Bach	2	3	0	0	0
CH_115_AI	FUB AG, Nikalus Müller	21.8.15	Veg. arm. Bach	3	0.48	0	0	0
CH_116_LU	AquaPlus, Ernst Roth	25.6.15	Helophytenbach	3	15.5	2	3	1
CH_119_NE	NE (Pascal Mulattieri)	19.6.15	Moosbach	3	25	1	1	4
CH_123_TI	FUB AG, Nikalus Müller	26.8.15	Moosbach	2	0.72	1	3	2
CH_126_VD	VD (Pascal Mulattieri)	7.8.15	Moosbach	1	20	1	1	4
CH_127_VD	VD (Pascal Mulattieri)	18.7.15	Submersenbach	3	95	2	2	2
CH 128 VD	VD (Pascal Mulattieri / Lionel Sager)	7.8.15	Moosbach	2	5	2	3	2
	VD (Pascal Mulattieri /							
CH_129_VD	Lionel Sager) VD (Pascal Mulattieri /	7.8.15	Veg. arm. Bach	2	1	0	0	0
CH_130_VD	Lionel Sager)	7.8.15	Moosbach	2	25	1	2	3
CH_131_VD	VD (Pascal Mulattieri)	2.7.15	Veg. arm. Bach	3	0	0	0	0
CH_132_VD	VD (Pascal Mulattieri)	2.7.15	Veg. arm. Bach	3	3	0	0	0
CH_133_BE	AquaPlus, Ernst Roth	29.6.15	Veg. arm. Bach	3	4.2	0	0	0
CH_134_BE	AquaPlus, Ernst Roth	26.8.15	Helophytenbach	2	13.5	3	3	1
CH_135_AR	FUB AG, Nikalus Müller	21.8.15	Veg. arm. Bach	1	0.08	0	0	0



Anhang C

Bewertungen aus den Jahren 2012 und 2015

Stelle			Aufnal	nmen				
			Resultat	e 2012		Resultat	e 2015	
ID	Gewäs- ser	Kt.	Ökom.	Bachtyp	Bew.	Ökom.	Bachtyp	Bew.
CH_002_BS	Birs	BS	3	veg. arm	0	3	Submersen	4
CH_007_BE	Emme	BE	2	Helophyten	2	3	Submersen	4
CH_009_SO	Limpach	SO	4	Submersen	2	3	Helophyten	1
CH_011_SO	Lüssel	SO	3	veg. arm	0	3	veg. arm	0
CH_012_OW	Sarneraa	OW	3	veg. arm	0	3	Submersen	4
CH_014_LU	Reuss	LU	3	Submersen	3	3	Submersen	3
CH_020_VD	Venoge	VD	1	Helophyten	1	3	Moosbach	3
CH_021_VD	Thièle	VD	3	Submersen	2	3	Submersen	3
CH_022_VD	Broye	VD	4	Submersen	3	3	Submersen	2
CH_023_SG	Steinach	SG	3	Helophyten	4	3	veg. arm	0
CH_025_SG	Sitter	SG	2	Moosbach	2		Moosbach	2
CH_026_SG	Thur	SG	2	Helophyten	3	2	veg. arm	0
CH_027_SG	Necker	SG	1	Moosbach	1		Moosbach	2
CH_028_SG	Glatt	SG	2	Moosbach	2		veg. arm	0
CH_032_AG	Pfaffnern	AG	1	Moosbach	4	2	Moosbach	2
CH_033_AG	Wyna	AG	3	Moosbach	4	2	Moosbach	3
CH_034_AG	Bünz	AG	2	Helophyten	3	2	Helophyten	1
CH_035_AG	Surb	AG	3	Helophyten	2	3	veg. arm	0
CH_036_AG	Sissle	AG	2	Moosbach	3	2	Moosbach	2
CH_039_AG	Suhre	AG	3	Moosbach	4	2	Moosbach	2
CH_040_ZH	Limmat	ZH	2	Submersen	4	2	Submersen	4
CH_041_ZH	Töss	ZH	3	Moosbach	1	3	veg. arm	0
CH_042_ZH	Sihl	ZH	4	veg. Arm	0	3	veg. arm	0
CH_043_ZH	Glatt	ZH	3	veg. Arm	0	3	Submersen	4
CH_044_ZH	Glatt	ZH	2	Submersen	3	3	Submersen	3
CH_045_ZH	Aabach	ZH	3	Submersen	3	3	Submersen	3
CH_046_ZH	Aa	ZH	4	Moosbach	2	3	veg. arm	0
CH_047_ZH	Reppisch	ZH	3	veg. Arm	0	3	veg. arm	0
CH_048_ZH	Jona	ZH	1	Moosbach	2	2	veg. arm	0
CH_049_ZH	Furtbach	ZH	3	Submersen	3	3	Submersen	2
CH_050_ZH	Thur	ZH	2	veg. Arm	0	2	veg. arm	0
CH_054_FR	Sionge	FR	1	Moosbach	1	2	Moosbach	1
CH_056_BE	Engstlige	BE	2	veg. arm	0	1	veg. arm	0
CH_058_BE	Chise	BE	3	Moosbach	2	3	Moosbach	3
CH_059_BE	Gürbe	BE	2	Submersen	2	2	Submersen	2
CH_060_BE	Sense	BE	2	veg. Arm	0	2	veg. arm	0
CH_062_BE	Urtenen	BE	3	Helophyten	2	3	Submersen	4
CH_063_BE	Langete	BE	3	Moosbach	2	3	veg. arm	0
CH_065_ZH	Sihl	ZH	2	Moosbach	1	2	Moosbach	1
CH_066_ZH	Töss	ZH	3	Moosbach	1	3	veg. arm	0
CH_067_BL	Ergolz	BL	2	veg. Arm	0	2	veg. arm	0
CH_068_JU	Sorne	JU	3	Moosbach	1	2	Submersen	3





CII 060 III	C -ll+ -		_	NA l l-	1	2	N 4 -	2
CH_069_JU	Scheulte	JU	3		1	3	Moosbach	2
CH_070_TG	Murg	TG	3		2	3	veg. arm	0
CH_071_TG	Lauche Chem-	TG	3	Helophyten	2	3	Helophyten	2
CH_072_TG	menbach	TG	3	Helophyten	2	3	Helophyten	2
CH 072 TC	Salmsa-	TC	_		0	2		0
CH_073_TG	cher Aach Engelber-	TG	2	veg. arm	0	2	veg. arm	0
CH_074_NW	geraa	NW	3	Moosbach	2	2	veg. arm	0
CH_075_ZG	Lorze	ZG	2	Submersen	3	2	Submersen	3
CH_076_ZG	Lorze	ZG	3	Moosbach	1	3	veg. arm	0
CH_079_SG	Aabach	AG	2	veg. Arm	0	1	Moosbach	4
CH_084_JU	Allaine	JU	3	Submersen	3	3	Helophyten	2
CH_085_NE	Areuse	NE	3	Moosbach	2	3	Moosbach	2
CH_087_JU	Birs	JU	3	Moosbach	2	3	Helophyten	2
CH_088_JU	Doubs	JU	2	Submersen	4	2	Helophyten	2
CH_089_SO	Dünnern	SO	3	Moosbach	4	3	veg. arm	0
CH_091_GR	Inn	GR	2	veg. arm	0	k	Keine Aufnahm	ne
CH_092_BE	Kander	BE	3	veg. arm	0	3	veg. arm	0
CH_093_LU	Kleine		2	vog arm	0	2	voa arm	0
CH_093_E0	Emme La Suze	LU BE	3		0	3	veg. arm	0
		GR	3				veg. arm	0
CH_095_GR CH_098_TI	Landquart	TI	2		0	2	veg. arm	0
	Maggia		2		0	2	veg. arm	2
CH_099_TI CH_100_SZ	Moesa	TI SZ	3		4	3	Moosbach Submersen	3
	Muota	BE	3		2	3	Submersen	4
CH_106_BE CH_107_FR	Saane	FR	3		0	2		0
CH_111_AG	Sarine	AG	3		4	3	veg. arm	0
CH_111_AG CH_114_BE	Wigger Emme	BE	3		0	2	veg. arm	0
CH_115_AI	Sitter	Al	3	- 3 -	0	3	veg. arm	0
CH 116 LU	Ron	LU	3		4	3	veg. arm Helophyten	1
CH_119_NE	Seyon	NE	3		2	3	Moosbach	4
	Maggia	TI	2		2	2		0
CH_123_TI CH_126_VD	Mentue	VD	1	Moosbach	4	1	veg. arm Moosbach	4
CH_127_VD	Talent	VD	3					
CH_127_VD	Proment-	VD	3	Submersen	2	3	Submersen	2
CH_128_VD	house	VD	2	veg. arm	0	2	Moosbach	2
CU 130 VD	Boiron de	VD	,	V 0 6 0 0 0 0 0	0	2	110 0 0 0 0 0 0	0
CH_129_VD	Morges	VD	2		0	2	veg. arm	3
CH_130_VD	Aubonne	VD	2	' '	2	2	Moosbach	
CH_131_VD	Veveyse Grande	VD	3	veg. arm	0	3	veg. arm	0
CH_132_VD	Eau	VD	3	veg. Arm	0	3	veg. arm	0
CH_133_BE	Simme	BE	2	Moosbach	2	3	veg. arm	0
CH_134_BE	La Birse	BE	3	Moosbach	2	2	Helophyten	1
CH_135_AR	Urnäsch	AR	2	Moosbach	2	1	veg. arm	0

Anhang D

Taxaliste mit Angabe der Fundhäufigkeit

Taxagruppe	Art_Namen	Anzahl Stellen
Algen	Fädige Algen unbestimmt	65
	Lemanea sp.	3
	Cladophora sp.	2
Armleuchterlagen	Chara globularis	2
Gefässpflanzen	Phalaris arundinacea	38
	Agrostis stolonifera	33
	Deschampsia caespitosa	21
	Nasturtium officinale	12
	Veronica beccabunga	10
	Equisetum arvense	9
	Phragmites australis	9
	Equisetum palustre	8
	Myriophyllum spicatum	8
	Glyceria sp.	7
	Glyceria notata	6
	Rubus sp.	6
	Taraxacum officinale	6
	Veronica anagallis-aquatica	6
	Callitriche sp.	5
	Carex sp.	5
	Epilobium hirsutum	5
	Glyceria fluitans	5
	Potamogeton pectinatus	5
	Rorippa palustris	5
	Salix purpurea	5
	Scirpus sylvaticus	5
	Carex pendula	4
	Epilobium roseum	4
	Equisetum sp.	4
	Filipendula ulmaria	4
	Mentha longifolia	4
	Polygonum amphibium	4
	Polygonum persicaria	4
	Reynoutria japonica	4
	Sparganium sp.	4
	Urtica dioica	4
	Cardamine amara	3
	Elodea nuttallii	3
	Eupatorium cannabinum	3
	Polygonum lapathifolium	3
	Polygonum sp.	3
	Potamogeton crispus	3
	Ranunculus fluitans	3
	Rumex obtusifolius	3
	Salix sp.	3
	Solanum lycopersicum	3
	Stellaria media	3
	Brachypodium sylvaticum	2
	Buddleya davidii	2
	Calystegia sepium	2
	Calystegla seplulli	





Cardamine sp.	2
Ceratophyllum demersum	2
Dactylis glomerata	2
Echinochloa crus-galli	2
Elodea canadensis	2
Epilobium sp.	2
Equisetum hyemale	2
Iris pseudacorus	2
Lysimachia vulgaris	2
Petasites hybridus	2
Plantago lanceolata	2
Plantago mayor	2
Poa annua	2
Poa sp.	2
Populus nigra	2
Ranunculus trichophyllus	2
Rumex scutatus	2
Salix caprea	2
Schoenoplectus lacustris	2
Setaria sp.	2
•	2
Setaria viride	
Sonchus sp.	2
Sparganium erectum	2
Tussilago farfara	2
Adenostyles alliariae	1
Adenostyles glabra	1
Adenostyles sp.	1
Amaranthus hybridus aggr.	1
Artemisia vulgaris	1
Athyrium filix-femina	1
Barbarea intermedia	1
Barbarea sp.	1
Barbarea vulgaris	1
Bellis perennis	1
Berula erecta	1
Betula pendula	1
Calamagrostis epigejos	1
Calamagrostis varia	1
Cardamine flexuosa	1
Carex elata	1
Cerastium fontanum	1
Circaea intermedia	1
Cirsium arvense	1
Coniza canadensis	1
Digitaria sanguinea	1
Epilobium dodonaei	1
Epilobium fleischeri	1
Epilobium montanum	1
Equisetum ramosissimum	1
Festuca arundinacea	1
Festuca gigantea	1
Festuca pratensis	1
Fragaria vesca	1
Galium mollugo	1
Geranium robertianum	1
Glechoma hederacea	1
Glyceria maxima	1
Отуссна шалина	1



	Groenlandia densa	1
	Impatiens glandulifera	1
	Impatiens noli-tangere	1
	Juncus articulatus	1
	Lolium perenne	1
	Lycopus europaeus	1
	Lythrum salicaria	1
	Melillotus sp.	1
	Mentha sp.	1
	Myosotis scorpioides	1
	Myosoton aquaticum	1
	Myriophyllum verticillatum	1
	Petasites sp.	1
	Poa nemoralis	1
	Polygonum mite	1
	Polygonum viviparum	1
	Potamogeton perfoliatus	1
	Potamogeton schreberi	1
	Potentilla reptans	1
	Prunella vulgaris	1
	Robinia pseudacacia	1
	Rubus caesius	1
		1
	Rumex sp.	·
	Salix alba	1
	Scrophularia nodosa	1
	Senecio vulgaris	1
	Solanum dulcamara	1
	Solanum nigrum	1
	Solidago canadensis	1
	Stachys palustris	1
	Typha latifolia	1
	Valeriana dioica	1
Moose	Fontinalis antipyretica	49
	Rhynchostegium riparioides	48
	Fissidens crassipes	37
	Cinclidotus riparius	28
	Amblystegium riparium	18
	Cratoneuron filicinum	17
	Cinclidotus fontinaloides	15
	Hygrohypnum luridum	14
	Amblystegium tenax	8
	Cinclidotus danubicus	7
	Pellia endiviifolia	7
	Amblystegium fluviatile	5
	Marchantia polymorpha	5
	Brachythecium rutabulum	4
	Lunularia cruciata	4
	Schistidium apocarpum	4
	Brachythecium rivulare	3
	Bryum bicolor agg.	3
	Calliergonella cuspidata	3
	Cinclidotus aquaticus	3
	Orthotrichum cupulatum	3
	Pellia sp.	3
•	·	
	Plagiomnium rostratum	3
	·	3 3 2



Brachythecium plumosum	2
Bryum capillare	2
Conocephalum conicum	2
Didymodon spadiceus	2
Fissidens dubius	2
Hygrohypnum durisculum	2
Orthotrichum sp.	2
Schistidium rivulare	2
Amblystegium varium	1
Barbula convoluta	1
Barbula unguiculata	1
Bryum pseudotriquetrum	1
Bryum sp.	1
Didymodon cf. fallax	1
Didymodon fallax	1
Didymodon luridus	1
Eurhynchium hians	1
Fissidens rufulus	1
Orthotrichum rivulare	1
Palustriella commutata	1
Palustriella falcata	1
Plagiomnium ellipticum	1
Plagiomnium undulatum	1
Pohlia sp.	1
Racomitrium aciculare	1
Rhizomnium punctatum	1
Schistidium cupulatum	1
Tortula tortuose	1

Anhang E

Stelleninformationen







01 2011020	000000000000000000000000000000000000000		Vonton	. domb andodas	7.0000		10/245 2-1/2 14	وزوييس باماره والمراس المارة والمراس المارة والمراس المارة والمراس المارة والمراس المارة والمارة والما		ti colucted de cure it
Stellen-IL	Stellen-ID Gewassername Stelle		Kanton	Kanton ernoben durch (Firma/Kanton)	Zugang			Sicherneitsninweis	_	beprobbarkeit
002	Birs	Birskopf	BS	AquaPlus	beidseitig	Zufahrt rechts	eingeschränkt (am Rand)	Schnelle Strömung und grosse Tiefe in der Mitte des		sehr eingeschränkt
								Gerinnes		
200	Emme	Gerlafingen	BE				watbar		5,	gut
600	Limpach	Kyburg	T		beidseitig		watbar			gut
011	Lüssel	Breitenbach			von links	_				gut
012	Sarneraa	Kägiswil		AquaPlus	beidseitig	•	eingeschränkt (am Rand)	Schnelle Strömung und grosse Tiefe in der Mitte des Strömung / Tiefe beachten Gerinnes		eingeschränkt
014	Reuss	Luzern, Seeauslauf	21	AquaPlus	von links		sehr eingeschränkt	Schnelle Strömung und grosse Tiefe, Strömung / Tiefe beachten Schwimmweste, zu Zweit		sehr eingeschränkt
020	Venoge	Les Bois	ΛD	Biol'Eau / VD	von links		eingeschränkt	ur eau > 1 m à certains	Strömung / Tiefe beachten Schwall / Sunk eingeschränkt	singeschränkt
021	Thièle	Yverdon	ΛD	Biol'Eau / VD k	beidseitig		sehr eingeschränkt	tres limitée, à cause profondeur eau > 2 m au milieu Strömung / Tiefe beachten du cours d'eau		eingeschränkt
022	Broye	Domdidier		au / VD	beidseitig		chränkt	limitée, à cause profondeur eau > 1 m à certains Strömung / Tiefe beachten endroits du tronçon		gut
023	Steinach	Mattenhof	98	FUB	von rechts	steiles Profil, auf watbar rechter Seite Treppe	vatbar		<u>. 3</u>	gut
025	Sitter	Leebrugg	SG		von links			ite		eingeschränkt
970	Inur	Gonplatz	T		von recnts			grosse liefe auf linker Flussseite Stromung / liefe beachten		eingeschrankt
020	Necker Clott	Letzl	T		peldseltig	3	chrankt	Begenbarkeit wecnselseitig Stromung / Here beachten		eingeschrankt
030	Glatt	Buechental	Т	FUB	Deldseltig		watbar			gut
033	Wyna	Subr	T		Voli IIINS	- 12	watbar			gar
034	Bünz	Möriken	AG		beidseitig	>	watbar		,, 0	aut
035	Surb	Döttingen	П		beidseitig	2	watbar		3	gut
036	Sissle	Eiken	ıı		von links					gut
039	Suhre	Suhr		AquaPlus \	von links	9		Grosse Tiefe in der Mitte des Gerinnes Strömung / Tiefe beachten		eingeschränkt
040	Limmat	Hönggersteg				Aussenkurve lii links: sehr tief nr und hohe pströmung, nur Ufersteine Deprobbar wo Uferverbauung defekt	thränkt,	hohe Strömung und Tiefe linkes Ufer, von Rechts bei Strömung / Tiefe beachten tiefem Wasserstand etwa zu 1/4 watbar		eingeschränkt
140	Töss	Freienstein	ZH	Zürich / AWEL	von rechts	linkes Ufer tiefer watbar bei tie als rechtes Ufer Wasserstand	fem	bei hohem Wasserstand zu hohe Strömung und zu tief	<u>.,</u>	gut
042	Sih	Sinihölzli	HZ	Zürich / AWEL	von links	linkes Ufer tiefer watbar bei tiefem als rechtes Ufer Wasserstand		bei hohem Wasserstand zu hohe Strömung und zu tief	3	gut
043	Glatt	Rheinsfelden	ΗZ	Zürich / AWEL	von rechts	nur von rechts s zugänglich	sehr eingeschränkt	bei hohem Wasserstand zu hohe Strömung und zu Strömung / Tiefe beachten tief, Schwellen mit Moosen, die aber wegen Strömung nicht beprobar sind.		eingeschränkt
044	Glatt	Abfluss Greifensee			beidseits		watbar bei tiefem Wasserstand	bei hohem Wasserstand zu tief	3	gut
045	Aabach	Mönschaltdorf	HZ		von links	1	watbar		3,	gut
046	Aa	Niederuster	- 1		von links		watbar			gut
047 047	Keppisch	Dietikon	- 1	Zürich / AWEL	von links	> ×	watbar			gut
\$	5				•	nogener shnitt	Vatual			The state of the s
049	Furtbach	nach ARA Ottelfingen	ZH	Zürich / AWEL k	beidseits	_	watbar		5	gut



Stellen-IL	Stellen-ID Gewassername	Stelle	Nanton	Kanton erhoben durch Zug (Firma/Kanton)	Zugang		Watbarkeit	Sicherheitshinweis		Beprobbarkeit
050	Thur	Andelfingen	HZ ZH	Zürich / AWEL	von rechts	Aussenkurve innks. sehr tief und hohe Strömung, nur Ufersteine beprobbar, Fluss von rechts bis etwa zu 1/3 watbar wathar	eingeschränkt	links zu tief und zu hohe Strömung, nur Uferverbauung stellenweise beprobbar	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
054	Sionge	Vuippens	FR	AquaPlus	beidseitig		watbar			gut
056	Engstlige	ob. Frutigen	BE		beidseitig		watbar			gut
058	Chise	ob. Oberdiessbach			beidseitig		watbar			gut
028	Gürbe	vor Mündung in Aare					watbar	teilweise tiefe Bereiche bei hohem Wasserstand	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
090	Sense	Thörishaus	П		beidseitig		watbar			gut
062	Urtenen	bei Schalunen	П		beidseitig		watbar			gut
063	Langete	Mangen, vor Kot Hütten	꿈	AquaPlus Zürich / AWEL	von links	tief und schnell	watbar sehr eingeschränkt	viele tiefe Kolken und schnelle Strömung	Strömung / Tiefe beachten	gut sehr eingeschränkt
990	Töss	Rämismühle, Zell	HZ	Zürich / AWEL	beidseitig		watbar bei tiefem Wasserstand			gut
290	Ergolz	Augst	ВГ	AquaPlus	von links		watbar			gut
890		Delémont		AquaPlus			watbar			gut
690	Scheulte	Vicques					watbar			gut
020	Murg	Frauenfeld			von rechts		watbar			gut
071	Lauche	Matzingen	TG		beidseitig		watbar			gut
072	Chemmenbach	Märstetten	П		beidseitig		watbar			gut
073	Salmsacher Aach	Salmsach	П		von rechts			mit tiefen Kolken		gut
074	Engelbergeraa	Oberdorf		AquaPlus	von links		eingeschränkt	Schnelle Strömung und grosse Tiefe auf der rechten Seite		k eingeschränkt
075	Lorze	Frauenthal	SZ	AquaPlus	von rechts	Zugang durch den Wald	watbar	Watbarkeit des ganzen Gerinnes vom Wasserstand abhängig	Strömung / Tiefe beachten	gut
920	Lorze	Letzi	SZ	AquaPlus	beidseitig		watbar	Watbarkeit des ganzen Gerinnes vom Wasserstand abhängig	Strömung / Tiefe beachten	gut
620		Niederlenz	1 1	AquaPlus	von rechts		chränkt (am Rand)	Schnelle Strömung und grosse Tiefe auf der linken Seite	Strömung / Tiefe beachten	gut
084		Boncourt		AquaPlus			watbar			gut
085		Boudry	쀨	Biol'Eau / NE	von links			Watbarkeit des ganzen Gerinnes vom Wasserstand abhängig		gut
087	Birs	Les Riedes-Dessus	Ωŗ	AquaPlus				Einzelne Stellen infolge grosser Tiefe/ Strömung nicht zugänglich	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
880	Doubs	Ocourt	Ωŗ	AquaPlus			eingeschränkt	Einzelne Stellen infolge grosser Tiefe nicht zugänglich	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
680	Dünnern	Olten	SO	AquaPlus	beidseitig	Zufahrt verboten watbar				gut
092	Kander	unt. Wasserfassung Hondrich	BE	AquaPlus			watbar	Schwall/Sunk Strecke, bei Zentrale nachfragen/informieren	Schwall / Sunk	k gut
093	Kleine Emme	Littau	2	AquaPlus	von links		watbar	Watbarkeit des ganzen Gerinnes vom Wasserstand abhängig		gut
094	Suze	Biel	BE	AquaPlus			eingeschränkt	Einzelne Stellen infolge grosser Tiefe nicht	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
960	Landquart	Felsenbach	GR		von rechts		eingeschränkt	zu Zweit	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
860		Locarno			beidseitig			grosse Tiefe wechselnd; zu Zweit	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
660		Lumino			von links			Schwall und Sunk; zu Zweit	Schwall /	k eingeschränkt
100	Muota	ngenboh	SZ	AquaPlus	peidseitig		watbar	Schwall/Sunk Strecke, Zugang bis 07:00 gegeben	Schwall / Sunk gut	- ant







Stellen-ID	Stellen-ID Gewässername Stelle	Stelle	Kantor	Kanton erhoben durch Zugang (Firma/Kanton)	Zugang		Watbarkeit	Sicherheitshinweis		Beprobbarkeit
106	Saane	Marfeldingen	BE	AquaPlus			watbar	Schwall/Sunk Strecke, bei Zentrale nachfragen/informieren	Schwall / Sunk gut	gut
107	Sarine	Broc	Ä	AquaPlus	beidseitig		sehr eingeschränkt	Schnelle Strömung und grosse Tiefe, Schwimmweste Strömung / Tiefe beachten	trömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
111	Wigger	Zofingen	AG	AquaPlus	beidseitig		watbar			gut
114	Emme	Emmenmatt	BE)		watbar			gut
115	Sitter	Appenzell	₹		von links	auf rechter Seite watbar	watbar			gut
	ı					Mauer	;			
116		Hochdorf	3				watbar			gut
119	Seyon	Valagin	뵘	Biol'Eau / NE	,,	auf linker Seite watbar	watbar	Pour descendre et monter dans le cours d'eau,		gut
						Fels		prendre escalier côté gauche juste devant le petit		
123	Maggia	Bronfallo	F	FUB	heidseitia		eingeschränkt	zu Zweit		duf
126	Mentine	Marigitat	5	-au/VD	von rechts		wathar	honne mais rive dallche nell accessible (vénétation		ger
0.71		iviaugueitaz	<u> </u>		VOIL GCIIICS		Watbal	dense)		gar
127	Talent	Chavornay	9	Biol'Eau / VD	beidseitig		watbar	bonne		gut
128	Promenthouse	Gland, Route Suisse	Q/	l	von links		watbar	bonne		gut
129	Boiron	Tolochenaz	9		beidseitig		watbar	bonne		gut
130	Aubonne	Allaman	9	l	von links		eingeschränkt	limitée, à cause profondeur eau > 1 m à certains St endroits du troncon	Strömung / Tiefe beachten	eingeschränkt
131	Veveyse	Vevey	Q.	Biol'Eau / VD	beidseitig		watbar	limitée, car présence de hauts murs sur les 2 rives		gut
								relevés impossible après une pluie (impact fort sur la visibilité)		
132	Grande Eau	Aigle	ΔΛ	Biol'Eau / VD	beidseitig		watbar	ives des ganzen Gerinnes	Strömung / Tiefe beachten	gut
133	Simme	Latterbach	BE	AquaPlus	beidseitig		watbar	Schwall/Sunk Strecke, bei Zentrale Stracken/informieren	Strömung / Tiefe beachten Schwall / Sunk gut	gut
134	La Birse	La Roche St. Jean	BE	AquaPlus			watbar			gut
135	Urnäsch	Kubel	AR		von rechts		watbar			gut



Anhang F

Feldprotokolle und Fotos aller Stellen





